

## Botox-hoito virtsarakkoon

---

Botox lääkeaineen tarkoituksena on rentouttaa virtsarakkolihasta. Tämä lisää virtsarakon vetoisuutta, vähentää virtsaamistarpeen tunnetta ja virtsan karkailua

### Valmistautuminen

Käy antamassa virtsanäyte kaksi viikkoa ennen toimenpidettä.

Toimenpidepäivänä voit syödä ja juoda normaalisti sekä ottaa lääkkeesi.

Tee huolellinen alapesu kotona ennen toimenpidettä.

### Valmistelut poliklinikalla

Tulehdusriskin vähentämiseksi saat tuntia ennen toimenpidettä antibiootin (yleensä siprofloksasiini) sekä kipulääkkeen (parasetamoli).

### Toimenpiteen suorittaminen

Virtsarakkoon viedään tähystin, jonka kautta Botox-lääkeaine ruiskutetaan virtsarakon seinämään. Voit kotiutua heti toimenpiteen jälkeen.

### Toimenpiteen jälkeen

Hoidon teho tulee esille noin kahden viikon kuluessa. Hoito voi aiheuttaa virtsaamisvaikeutta ja tarvittaessa sinulle opetetaan toistokatetrointi eli virtsarakon tyhjentäminen katetrilla. Jos et saa virtsattua, niin hakeudu päivystykseen.

Muutaman päivän ajan voi tuntua kipua virtsatessa ja virtsassa saattaa olla verta. Kipuun voit ottaa kipulääkettä ja virtsan verisyyden vähentämiseksi sinun kannattaa juoda tavanomaista enemmän.

### Yhteystiedot

#### Porin toimipiste

Kirurgian poliklinikka, uroterapeutti  
puhelin 044 707 3807  
tiistai - perjantai kello 8.00 – 14.00

#### Rauman toimipiste

Kirurgian poliklinikka, uroterapeutti  
puhelin 050 473 5916  
maanantaisin ja torstaisin kello 8.00 – 9.00

Satasairaala

[Satasairaalan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.satasairaala.fi](http://www.satasairaala.fi)

Asiakaspalvelu, puhelin 02 62771