

Ulostenäytteenotto, Clostridium difficile (F-CldTNhO 6141)

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksella etsitään antibioottiripulin tai sairaalassa alkaneen ripulin syytä.

Näytteenottovälineet

Voit noutaa näytteenottovälineet SataDiagin laboratorioista tai oman paikkakuntasi terveystieteidenkeskuksesta.

Tarvittavat välineet:

- näytepurkki
- suljettava muovipussi
- nimitarra

Näytteenotto

1. Ota ripulivaiheen ulostetta puhtaaseen kertakäyttöastiaan. Kova ulostenokare ei kelpaa näytteeksi.
2. Avaa näytepurkki. Siirrä kannessa olevalla lusikalla ulostetta purkkiin. Puoli purkillista on riittävä määrä.
3. Sulje purkki huolellisesti. Ulostetta ei saa jäädä purkin ulkopuolelle.
4. Varmista, että näytepurkissa on:
nimi
henkilötunnus
näytteenottopäivämäärä ja
kellonaika.

5. Laita näytepurkki muovipussiin. Sulje pussi tiiviisti.

Näytteen säilytys ja palauttaminen

Vie näytepurkki laboratorioon.

Näyte säilyy huoneenlämmössä kaksi vuorokautta.



Tarvittava näytepurkki

Yhteystiedot

Laboratorio
Palvelunumero 044 707 9761
arkisin kello 7.00 – 14.00

[SataDiagin verkkosivut löytyvät osoitteesta
www.satadiag.fi](http://www.satadiag.fi)