

# Eritetahradesinfektio

toteutetaan heti kun tahra havaitaan ja on jokaisen työntekijän velvollisuus!

- Veri, virtsa, mahasuoli-kanava-, haava-, trakea- ym. eritteet sisältävät paljon mikrobeja.
- Kosketus- ja lattiapinnoilla eritetahrat toimivat mikrobien kasvualustana ja ovat täten infektoriski.
- Eritetahrat tulee poistaa mahdollisimman pian ja aina ennen siivousta. Työtä tehtäessä käytetään suojakäsineitä ja tarvittaessa esiliinaa ja suun- nenäsuojusta.

## • Yksivaiheinen eritetahradesinfektio



Yksivaiheiseen eritetahradesinfektioon soveltuvia desinfektioaineita ovat esim. Klorilli 5000 ppm, Erisan Oxy+ 5%. Käytä aina suojakäsineitä.

1. Kaada desinfektioaine suoraan tahralle


2. Imeytä tahra ja desinfektioaine kertakäyttöiseen siivouspyyhkeeseen

3. Pyyhi alue vielä vedellä nihkeytetyllä siivouspyyhkeellä

3. Laita siivouspyyhe ja suojakäsineet roskiin

4. Desinfioi kädet huolellisesti

## • Kaksivaiheinen eritetahradesinfektio



Kaksivaiheiseen eritetahradesinfektioon soveltuvia desinfektioaineita ovat esim. Klorilli 1000 ppm, Erisan Oxy + 2%. Käytä aina suojakäsineitä.

1. Imeytä tahra esim. puuvanuun, imeytysliinaan tai muuhun imevään materiaaliin

2. Kostuta kertakäyttöinen siivouspyyhe desinfektioainelaimennoksella

3. Pyyhi alue siivouspyyhkeellä levittämättä tahraa

4. Laita siivouspyyhe ja suojakäsineet roskiin

5. Desinfioi kädet huolellisesti

# Eritetahradesinfektiossa tarvittavat välineet

**Pidä työyksikössä kaikkien tietämässä paikassa aina valmiina eritetahradesinfektiossa tarvittavat välineet esim. korissa:**

- Kertakäyttökäsineitä
- Kertakäyttöisiä siivouspyyhkeitä
- Roskapusseja
- Suu-nenäsuojuksia
- Kertakäyttöisiä esiliinoja
- Käsihuuhdetta
- Valmis desinfektioainelaimennos, pulloon merkitään viimeinen käyttöpäivämäärä
- Eritetahradesinfektio-ohje

**Tarkista ja täydennä korin sisältö säännöllisesti**

