

Keuhkobiopsia eli koepalan otto keuhkojen alueelta

Toimenpiteeseen valmistautuminen

Koepalan ottoa varten sinut kutsutaan päiväsairaalaan tutkimuspäivän aamuna. Sinut voidaan kutsua myös vuodeosastolle joko tutkimusta edeltävänä päivänä tai tutkimuspäivän aamuna.

Sinulta otetaan verikoe ennen toimenpidettä. Olet saanut sitä varten erillisen ohjeen sinua hoitavasta yksiköstä, eli siltä poliklinikalta tai osastolta, joka lähetti sinut koepalan ottoon.

Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana, ilmoita siitä hoitavaan yksikköön.

Jos sinulla on käytössä veren hyytymiseen vaikuttava lääke, ota yhteyttä hoitavaan yksikköön viimeistään viikko ennen toimenpideaikaa. Tämä on tärkeää, koska verenhennuslääkitys täytyy yleensä keskeyttää ennen näytteenottoa. Veren hyytymiseen vaikuttavia lääkkeitä ovat esimerkiksi:

- Marevan®
- Plavix®
- Pradaxa®
- Xarelto®
- Eliquis®
- Efixent®

- Brilique®
- Clopidogrel®
- Aspirin®
- Disperin®
- Primaspan®.

Ota yhteyttä hoitavaan yksikköön, jos sinulla on todettu allergia puuduteaineelle.

Toimenpidettä edeltävänä iltana kello 22.00 jälkeen et saa syödä etkä juoda. Saat ottaa pienen vesitilkan kanssa ne lääkkeitä, joita käytät säännöllisesti. Huomioi kuitenkin verenhennuslääkityksestä saamasi erillinen ohje.

Miten toimenpide tehdään

Toimenpide tehdään kuvantamisessa ja se kestää yleensä noin puoli tuntia.

Toimenpiteen ajan olet selälläsi, kyljelläsi tai vatsallasi. Tähän vaikuttaa se, mistä näyte otetaan. Hoitaja auttaa sinut mahdollisimman mukavaan asentoon. Tutkimuksen aikana on tärkeää, että pysyt liikkumatta.

Ennen näytteenottoa keuhkoista otetaan kuvia tietokonetomografia-laitteella. Tietokonetomografiassa otetaan röntgensäteiden avulla

viipalekuvia eli poikkileikkauskuvia.
Niiden avulla selvitetään
sopiva näytteenottoa.

Tämän jälkeen iho puhdistetaan
ja pistokohta puudutetaan
paikallispuudutuksella.
Röntgenlääkäri ottaa koepalan
näytteenottoneulalla.

Lopuksi näytteenottoa
peitetään sidoksella.

Toimenpiteen jälkeen

Toimenpiteen jälkeen
olet vuodelevossa 2 tuntia
joko päiväsairaalan
tai vuodeosaston seurannassa.

Vuodelevon jälkeen otetaan
röntgenkuva keuhkoista.
Pääset kotiin yleensä samana päivänä,
jos vointisi on hyvä.

Jos sinulla on kudostestien sokeria
mittaava sensori,
vaihda sensori uuteen.

Mistä saat toimenpiteen tulokset

Koepalan tuloksen valmistuminen
kestää 2-4 viikkoa.

Saat vastauksen hoitavasta yksiköstä.

Vastauksen kuulemista varten
saat käyntiajan tai soittoaajan.

Vastaus voidaan myös lähettää sinulle
Omakantaan tai kotiin kirjeenä.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää toimenpiteestä,
voit soittaa meille:

Satasairaalan kuvantaminen,
puhelin 044 707 9202.

Palvelemme sinua puhelimitse
maanantaista perjantaihin kello 8.00–14.30.

Esivalmisteluihin tai jälkihoitoon
liittyvissä asioissa
ota yhteyttä hoitavaan yksikköön.