

Virtsanäytteenotto, klamydia ja tippuri

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksella etsitään virtsasta bakteereita, jotka aiheuttavat klamydiaa ja tippuria.

Esivalmistelut

Ole virtsaamatta vähintään tunti ennen näytteenottoa.

Silloin virtsanäytteestä saadaan luotettava tulos.

Tarvittavat välineet:

- näytepurkki
- suljettava muovipussi
- nimitarra

Näytteenottovälineet voit noutaa

SataDiagin laboratorioista tai oman paikkakuntasi terveyskeskuksesta.

SataDiag laboratorion eri toimipisteiden aukioloajat ja tiedot ajanvarauksesta löydät internetistä osoitteesta

www.satadiag.fi

Klikkaa kohtaa Toimipisteet.



Näytteenotto:

1. Älä suorita alapesua.
2. Virtsaa purkkiin 20–30 ml.
Se on neljäsosa purkin tilavuudesta.
Virtsan ensimmäiset pisarat on tärkeää saada astiaan.
Virtsaa pitää olla vähintään 10 ml.
Virtsaa ei saa olla yli 30 ml.
Lyhenne ml tarkoittaa millilitraa.
Näytepurkissa on mitta-asteikko.



Tämä on oikea virtsamäärä näytepurkissa.

3. Varmista, että näytepurkissa on:
nimi
henkilötunnus
näytteenottopäivämäärä ja aika.
4. Laita näytepurkki muovipussiin.
Sulje pussi tiiviisti.

Näytteen säilytys ja palauttaminen

Tuo näytepurkki laboratorioon.

Näytepurkissa oleva virtsa säilyy vuorokauden jääkaapissa tai huoneenlämmössä.