

## Resistenttien bakteerien seulonta ja potilassijoittelu vuodeosastolla

Tilanne	Potilaan sijoittaminen sairaalassa	Seulontanäytteet sairaalaan tullessa
<b>Suora sairaalasiirto ulkomailta</b> Koskee myös potilasta, joka tulee sairaalahoitoon alle viikon sisällä ulkomaisesta sairaalahoitajaksosta.	<b>Kosketusvarotoimet</b> , 1 h huone, jossa oma WC ja suihku, kunnes moniresistenttien mikrobin kantajuus on poissuljettu, sen jälkeen tavanomainen sijoittelu.	<b>MRSA, VRE ja ResGNS</b>
Potilaat, jotka ovat <b>edeltäneen vuoden aikana olleet ulkomailta lääkärin/hammaslääkärin hoidossa tai sairaalassa/laitoksessa/pakolaisleirillä tai lastenkodissa, mutta eivät tule suorana sairaalasiirtona</b>	<b>Tavanomaiset varotoimet</b> , 1-2 h potilashuone, kunnes moniresistenttien mikrobin kantajuus on poissuljettu, sen jälkeen tavanomainen sijoittelu	<b>MRSA, VRE ja ResGNS</b> , jos näytteitä ei ole otettu ko. hoitajaksi jälkeen.
Potilaat, jotka ovat <b>edeltäneen vuoden aikana asuneet vastaanottokeskuksissa</b>	<b>Kosketusvarotoimet</b> , 1 h huone, jossa oma WC ja suihku, kunnes moniresistenttien mikrobin kantajuus on poissuljettu, sen jälkeen tavanomainen sijoittelu.	<b>MRSA, VRE ja ResGNS</b>
Potilaat, jotka ovat <b>edeltäneen vuoden aikana asuneet tai työskennelleet sikatilalla</b>	<b>Tavanomaiset varotoimet</b> , 1-2 h potilashuone, kunnes moniresistenttien mikrobin kantajuus on poissuljettu, sen jälkeen tavanomainen sijoittelu	<b>MRSA</b>
Riskitiedoissa merkintä: <b>Eristystä vaativa kantajuus: CPE, MRSA, VRE, ESBL-Klebsiella kannat, MDR-Pseu tai MDR-Acin</b>	<b>Kosketusvarotoimet</b> 1 h huone, jossa oma WC ja suihku. Liikkuminen osastolla huoneen ulkopuolella on mahdollista infektiöyksikön ohjeistamana	Vain infektiöyksikön ohjeistamana
Riskitiedoissa merkintä: <b>Hoidossa huomioitava kantajuus: ESBL- E-coli</b>	<b>Tavanomaiset varotoimet</b> Normaali huonesijoittelu tai yhden hengen huone, jos potilaan ympäristö kontaminoituu eritteillä (esim. ulosteella, virtsalla, haavaeritteellä tai ihohilseellä)	
Riskitiedoissa merkintä: <b>Hoidossa huomioitava altistus (CPE)</b>	<b>Tavanomaiset varotoimet</b> 1-2 h potilashuone, jossa on WC ja pesutila, kunnes CPE:n kantajuus poissuljettu, sen jälkeen tavanomainen sijoittelu.	<b>ResGNS</b>
Riskitiedoissa merkintä: <b>Hoidossa huomioitava altistus (MRSA)</b>	<b>Tavanomaiset varotoimet</b> 1-2 h potilashuone, jossa on WC ja pesutila, kunnes MRSA:n kantajuus poissuljettu, sen jälkeen tavanomainen sijoittelu.	<b>MRSA</b>
Riskitiedoissa merkintä: <b>Hoidossa huomioitava altistus (VRE)</b>	<b>Tavanomaiset varotoimet</b> 1-2 h potilashuone, jossa on WC ja pesutila, kunnes VRE:n kantajuus poissuljettu, sen jälkeen tavanomainen sijoittelu.	<b>VRE</b>

Näytteenotto-ohjeeseen pääset [tästä](#)