

## Rokotussuositus potilaille, joilla on likvorfisteli tai sen perusteltu epäily tai koklea -implantti

---

Rokotukset alla olevia tauteja vastaan katsotaan osaksi hyvää hoitoa ja ne ovat potilaalle maksuttomia, kustannukset sisällytetään poliklinikkamaksuun. Ensimmäisten rokotuksen antamisesta vastaa erikoissairaanhoido (korvasairauksien klinikka), mahdollisista jatkorokotuksista huolehtii terveyskeskus tämän ohjeen perusteella. Valtio ei toistaiseksi korvaa näitä rokotuksia.

Rokotuksen antava hoitaja kirjaa annetut rokotukset Lifecareen rokotuslehdelle ROS2 (Rokotuksen seuranta, aikuiset) tai ROS1 (Rokotuksen seuranta, lapset) sekä tähän kaavakkeeseen, joka annetaan potilaalle. Annettu rokote kirjataan myös potilaan sairaskertomukseen erikoisalalehdelle. Hoitavan lääkärin tulee huolehtia, että potilaan rokotukset ovat kunnossa. Tarvittaessa korvalääkäri voi konsultoida infektio­lääkär­iä ja rokotukset voidaan tällöin hoitaa myös infektio­poli­klinikalla.

### Pneumokokki

#### Uudet potilaat

1. annos: PCV-konjugaattirokote (Prevenar13®) vähintään 2 viikkoa ennen implantin asennusta tai kun herää perusteltu epäily likvorfistelistä. Rokote antaa tehokkaan suojan rokotteen sisältämää 13 serotyyppiä kohtaan.

2. annos: PPV-polysakkaridirokote (Pneumovax®) aikaisintaan 8 viikon kuluttua PCV-rokotuksesta. Rokotteet pitää antaa tässä järjestyksessä, muuten rokotusten teho voi heikentyä. Pneumovax tuottaa Prevenaria heikomman vasta-ainetaso­n, mutta antaa lisäsuojaa 10 serotyyppiä vastaan (23 seroryhmää).

Tehosteannos: Uuden suosituksen mukaisesti kaksi rokotetta saaneiden jatkorokotustarve on vielä selkiytymätön. Lisärokotuksia ei todennäköisesti tarvita, mutta tällä hetkellä vielä suositellaan annettavaksi toinen PPV-polysakkaridirokote (Pneumovax), kun 5 vuotta on kulunut ensimmäisestä. Sen jälkeen tehostetta ei tarvita.

Prevenar13® 0,5 ml i.m. Pistetty \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Pneumovax® 0,5ml s.c. tai i.m

I Pistetty \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

II Pistetty \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## Kesäkuussa 2010 tai sen jälkeen syntyneet

Kesäkuussa 2010 tai sen jälkeen syntyneille on tarjottu PCV-konjugaattirokotusta kansallisessa rokotusohjelmassa. Mikäli he ovat sen saaneet, he eivät tarvitse Prevenaria, mutta tarvitsevat PPV-polysakkaridirokotteen. Tarkasta mahdollinen rokotuspäivä, jos potilas kuuluu tähän ikäryhmään.

PCV Pistetty \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

## Aiemmin Pneumovax-rokotteen saaneet potilaat

Aiemmin Pneumovax-rokotteen saaneille pernanpoistopotilaille on suositeltu tehosterokotusta 5 vuoden välein. Uusi suositus pneumokokkirokotteiden jatkosta on kirjattu oheiseen yhteenvetotaulukkoon.

Kaavio annettavista pneumokokkirokotteista (Lähde: THL:n pneumokokkisuositus)

Aiemmin saadut pneumokokkirokotteet	Anna PCV13-rokotetta (Prevenar 13)	Harkinnan mukaan anna PPV-rokotetta (Pneumovax)
Ei yhtään	yksi annos	yksi annos aikaisintaan 8 viikon kuluttua PCV-rokotteesta (tarvittaessa toinen annos 5 vuoden kuluttua)
PPV (Pneumovax)	yksi annos aikaisintaan vuoden kuluttua PPV-rokotteesta	yksi annos aikaisintaan neljän vuoden kuluttua PCV-rokotteesta
PCV (Lasten rokotusohjelmassa oleva pneumokokkirokote)	-	yksi annos aikaisintaan 8 viikon kuluttua PCV-rokotteesta (tarvittaessa toinen annos 5 vuoden kuluttua)

## Meningokokki

1. annos: Konjugoitu meningokokkirokote ACWY (Menveo® tai Nimenrix®) noin 2 viikkoa ennen leikkausta, jos mahdollista tai mahdollisimman pian leikkauksesta toipumisen jälkeen  
Tehosteannos: Käytettäessä konjugaattirokotetta tehosteita ei nykykäsitöksen mukaan tarvita.  
Menveo® 0,5 ml i.m tai Nimenrix® 0,5 ml i.m. (Ympyröi annettu rokote)

Pistetty \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

## **Hemophilus influenzae**

Hib-rokote on kuulunut kansalliseen rokotusohjelmaan jo 1990-luvun alusta alkaen. Jos rokotetta ei ole saanut, annetaan se ennen pernanpoistoa.

1. annos: Hib-rokote (Hiberix®) noin 2 viikkoa ennen leikkausta, jos mahdollista tai mahdollisimman pian leikkauksesta toipumisen jälkeen

Tehosteannos: Hib-rokotuksia ei nykyäesityksen mukaan tarvitse tehostaa.

Hiberix® i.m tai s.c. Pistetty \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

### **Yhteystiedot**

Infektioyksikkö  
Puhelin 044 707 6874

SataDiag

[SataDiagin verkkosivut löytyvät osoitteesta www.satadiag.fi](http://www.satadiag.fi)