

Staph. aureus -kantajuuden kevennyshoito ja traumakirurgia, jossa laitetaan koko- tai puoliproteesi

Toimintaohje henkilökunnalle


Kansainvälisten tutkimusten perusteella tiedetään, että *Staph. aureus*- bakteerin iho- ja nenäkantajuus lisäävät haavatulehduksen ja proteesi-infektion riskiä ja kantajuuden kevennyshoito vähentää tulehdusriskiä. Traumapotilaiden kohdalla kantajuutta ei ole mahdollista etukäteen tutkia.

Infektioyksikön suosituksesta on yhdessä ortopedien kanssa päätetty, että infektioriskin pienentämiseksi **traumakirurgiassa, jossa potilaalle laitetaan koko- tai puoliproteesi**

- kaikille potilaille tehdään **klorheksidiini-pesu** ennen operaatiota
 - mieluiten suihkussa [Ericept CHG-vaahtoa](#) käyttäen. Vahto hierotaan kostutetulle iholle ja hiuspohjaan, annetaan vaikuttaa 2 minuuttia ja huuhdellaan pois.
 - Jos potilasta ei voida viedä suihkuun, käytetään pesussa Bagbath Chlorhexidine 2% liioja pakkauksessa olevan ohjeen ja oheisen kuvan mukaan
 - Jos leikkaus siirtyy, pesut uusitaan kerran päivässä.
- Lisäksi aloitetaan **mupirosiinihoito (Bactroban Nasal 2 %)** **nenään** molempiin sieraimiin x 2 viiden vrk:n ajan (1 tuubi). Nasal-nenävoidetta sivellään molempiin sieraimiin pumpulipuikolla noin 1 cm:n pituinen annos. Lääkkeen ottamisen jälkeen sieraimet suljetaan painamalla nenää sivuilta useita kertoja. Mupirosiinihoito pyritään aloittamaan mahdollisimman pian leikkauuspäätöksen jälkeen, mielellään jo päivystyspoliklinikalla. Päivystyspoliklinikalla aloitettu hoito kirjataan päivystyksen seurantakaavakkeelle. Mupirosiini-voide kulkee potilaan mukana. Osastolla aloitettu hoito kirjataan **HOKE:en ja osaston lääkelistalle**. Leikkausosastoa varten tiedot kirjataan preoperatiiviseen vaiheeseen tulotilanne –välilehdelle muut huomiot kohtaan.
- Leikkaussalissa tarkastetaan, ovatko nämä toimet tapahtuneet. Jos hoitoa ei ole aiemmin aloitettu, mupirosiinihoito käynnistetään viimeistään leikkaussalissa.

BagBath Chlorhexidine 2%

Käyttöohje



Pakkaus voidaan lämmittää mikroaaltouunissa (15 - 30 sekuntia riippuen mikroaaltouunin tehosta). Vältä pakkauksen ylikuumentamista.

1. Avaa paketti. Käsittele lämmitettyä pakkausta varoen, sillä se voi olla kuuma.
2. Pese potilas käyttäen yhden liinan kuhunkin kehonosaan, jotka on listattu yllä olevassa kuvassa. Pese potilaan kehonosat siinä järjestyksessä, joka vastaa käytössänne olevaa pesuohjeistusta.
3. Anna ihon kuivua.
4. Hävitä kaikki käy käytetyt ja pakkauksesta ylijääneet pesuliinat.

Kuva: Käyttöohje: www.steripolar.fi