

ÄÄREISLASKIMOKANYYYLIN LAITTAMINEN

1. Desinfioi kädet (20 -30 sekuntia).
2. Kerää välineet: kanyyli, denaturoitu alkoholi (vähintään 70 %) tai alkoholisetrimoni (esim. Dermades®), tehdaspuhtaat taitokset, särmäjäteastia, puoliläpäisevä läpinäkyvä kalvo, staasi, tehdaspuhtaat suojakäsineet ja käyttövalmis 5ml NaCl 0,9% ruisku kanyylin testausta varten. Täytyä tarvittaessa infuusioletku valmiiksi sovitulla infuusionesteellä. Lisää tarvittaessa 3-tiehana.



3. Valitse käyttötarkoitukseen soveltuva turvamekanismilla varustettu ja mahdollisimman pieni kanyyli, jotta verivirtaus suonessa säilyy.
4. Desinfioi kädet (20-30 sekuntia).
5. Aseta staasi paikalleen ja valitse palpoiden pistokohta. Suositeltava paikka katetrille on ei-dominoivan yläraajan kämmenselässä tai kyynärvarressa. Pistopaikkana tulee välttää taivealueita, tulehtunutta raajaa tai rikkiäistä ihoa.
6. Iho puhdistetaan alkoholisetrimonilla (esim. Dermades®) tai vähintään 70 % alkoholilla kostutetulla tehdaspuhtaalla taitoksella. Pyyhi iho yhteen suuntaan napakasti. Toista sama uudella kostutetulla taitoksella.
7. Anna desinfektioaineen kuivua pistokohdasta ennen pistoa! Älä kosketa pistokohtaa desinfektion jälkeen!



8. Desinfioi kädet (20-30 sekuntia) ja laita tehdaspuhtaat suojakäsineet.



9. Kanyloi suoni ja löysää staasi. Vedä neula kanyylistä, laita se suoraan särmäjäteastiaan.
10. Yhdistä infuusioletku kanyyliin ja testaa kanyylin paikka infuusionesteellä tai keittosuolaruiskulla. Säädä sopiva tiputusnopeus.
11. Kanyyli kiinnitetään huolellisesti, jotta se ei pääse liikkumaan suonessa.
12. Kanyylin pistokohta suojataan kalvolla, josta voidaan tarkkailla kanyylin pistoskohtaa päivittäin.
13. Poista suojakäsineet suoraan jäteastiaan ja desinfioi kädet.
14. Kirjaa potilastietoihin kanyylin laittopäivä, katetrin koko ja asetuspaikka. Arvioi kanyylin tarve jatkossa päivittäin.

Kanyyliin yhdistettyjen välineiden täytyy säilyä yhdistettäessä steriileinä!