

CRH-koe (Pt-CRH-R, 3132)

Tutkimuksella selvitetään aivolisäkkeen ja lisämunuaisen kuorikerroksen hormonieritystoimintaa tutkimuksessa käytettävän testiaineen (CRH) avulla.

Valmistautuminen tutkimukseen

1. Ole syömättä ja juomatta edellisestä illasta kello 22:00 alkaen.
2. Voit juoda aamulla lasillisen vettä.

Useat lääkeaineet voivat vaikuttaa tutkimuksen tulokseen.

1. Kerro hoitavalle lääkärille, mitä lääkkeitä käytät; sekä jatkuvassa käytössä olevat lääkkeet että sellaiset, joita käytät vain satunnaisesti. Hoitava lääkäri päättää ja antaa ohjeet lääkityksen mahdollisesta keskeyttämisestä testiä varten.

Tutkimuksen suoritus

1. Tutkimuksen alkaessa laskimoon asetetaan verisuonikanyyli.
2. Tutkimuksessa käytettävä testiaine (CRH) annetaan suoneen asetetun verisuonikanyylin kautta. CRH:n anto saattaa aiheuttaa ohimenevää kasvojen kuumotusta, pahoinvointia ja huimausta.
3. Tutkimuksessa tarvittavat verinäytteet otetaan verisuonikanyylin kautta.
4. Kun tarvittavat verinäytteet on otettu, kanyyli poistetaan.

Kokeen tekemiseen kuluu aikaa noin 2 1/2 tuntia.

Voit ottaa kokeen suoritukseen liittyvissä kysymyksissä yhteyttä tutkimusta pyytäneeseen osastoon tai poliklinikkaan. Vastausta voit tiedustella hoitavasta yksiköstä.

Laboratoriotutkimuksista voit lukea lisää Terveyskylän [Tutkimukseen tulijan talosta](#).

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • www.vsshp.fi • Vaihde 02 313 0000

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.