

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAHOITOPIIRI

EREKTIOPROTEESI

Erektiohäiriöön, johon muut hoidot eivät vaikuta, voidaan käyttää erektioproteesia. Proteesi koostuu kahdesta keinotekoisesta paisuvaisesta, pumpusta ja varastopallosta. Keinotekoisilla paisuvaisilla korvataan oma paisuvaiskudos eli proteesin laiton jälkeen millään muulla menetelmällä erektio ei enää ole mahdollista, vaikka proteesi poistettaisiin. Proteesin pumppu on yhdistetty letkuostolla paisuvaisiin ja nesteen varastopalloon. Pumppu asetetaan kivespussiin ja pallo vatsaonteloon.

Leikkaus

Leikkaus voidaan tehdä joko yhdestä tai kahdesta haavasta. Ensimmäinen haava tulee aina kivespussin ja siittimen väliin. Toista lyhyttä viiltoa käytetään alavatsalla varastopallon asettamista varten. Koska leikkausalueella on normaalisti runsaasti bakteereja ja vierasesineillä on voimakas taipumus tulehtua, käytetään ennen leikkausta ja sen jälkeen voimakkaita antibiootteja yleisesti kahden viikon ajan. Leikkauksen jälkeen asetetaan virtsakatetri, jota pidetään seuraavaan päivään.

Kotihoito

Kotiin pääset leikkauksen jälkeisenä päivänä.

- Haavanhoidosta annetaan erillinen ohje.
- Vältä rasitusta ja raskasta nostamista neljä viikkoa leikkauksesta.
- Sairasloman pituus on 4-6 viikkoa.
- Pyörällä ei saa ajaa sairausloma-aikana.

Ota yhteyttä urologian vuodeosastolle, jos

- nousee kuume
- leikkausalue punoittaa voimakkaasti, kuumottaa tai tulee poikkeavaa ihottumaa
- haavoilta erittyy märkää
- tuntuu poikkeavaa jatkuvaa kipua
- proteesin osa tulee näkyviin

Proteesin käyttöönotto

Proteesin käyttöönotto tapahtuu urologian poliklinikalla lääkärin vastaanotolla ohjatusti kuuden viikon kuluttua. Samalla varmistetaan, että proteesi toimii kunnolla ja hallitset sen käytön. Proteesia ei saa käyttää ennen tätä.

Proteesin osat ovat mekaanisia ja niissä tapahtuu kulumista. Käyttöikä vaihtelee muutamasta vuodesta jopa 20 vuoteen. Ennen pitkää proteesi tulee vioittumaan. Tuolloin voidaan mahdollisesti vaihtaa vain vioittunut osa pienemmässä leikkauksessa.