

Ergospirometria

Miksi tutkimus tehdään?

Tutkimuksessa seurataan sydämen ja keuhkojen toimintaa rasituksen aikana. Ergospirometriatutkimusta käytetään rasisastman osoittamiseen, epäselvän hengenahdistusoireen syyn selvittelyyn sekä työ- ja toimintakyvyn sekä fyysisen suorituskyvyn arviointiin.

Miten valmistaudun tutkimukseen?

Ota mukaan

- Kuntopyöräilyyn sopivat kevyet housut (esimerkiksi verryttelyhousut)
- Lenkkitosutyypiset jalkineet
- Naiset voivat ottaa mukaansa väljän T-paidan polkemisen ajaksi. Halutessasi voit ottaa mukaasi myös kaarituettomat liivit, esimerkiksi urheiluliivit.
- Lääkelista käytössäsi olevista lääkkeistä.

Hoitava lääkärisi päättää lääkkeiden käytöstä ja mahdollisesta lääketauosta ennen tutkimusta. Lyhytvaikutteisia nitroja (Nitro, Nitromex) ja nitrosuihkeita (Dinit) tulee välttää kaksi tuntia ennen tutkimusta, mikäli se on mahdollista. Ota yhteyttä tämän ohjeen liitteessä olevaan puhelinnumeroon, jos joudut ottamaan edellä mainittuja lääkkeitä juuri ennen tutkimusta.

Nautintoaineet, ruokailu ja liikunta vaikuttavat sykkeen ja verenpaineen tasoon. Tämän vuoksi sinun tulee olla ennen tutkimusta

- Vähintään **kaksi tuntia** ilman tupakkaa.
- Vähintään **neljä tuntia** ilman kahvia, teetä, kola- ja muita piristäviä juomia.
- Vähintään **kaksi vuorokautta** ilman alkoholia.

Lisäksi

- Raskasta ateriaa tulee välttää, mutta **ravinnotta ei saa olla**. Nauti pari tuntia ennen tutkimusta esimerkiksi lasillinen maitoa ja sämpylä.
- Tutkimusta edeltävänä päivänä sekä tutkimuspäivänä pitäisi välttää voimakasta fyysistä rasitusta ja nukkua yö hyvin.
- Tutkimusta ei tehdä hengityselintulehduksen tai muun tilapäisen tulehdussairauden (esim. flunssa, kuume, kurkkukipu) aikana, eikä ennen kuin paranemisesta on kulunut kaksi viikkoa.

Miten tutkimus tehdään?

Aluksi mittaamme pituutesi ja painosi. Kiinnitämme rintakehälle, raajoihin sekä selkään liimalappuelektrodeja, joilla rekisteröidään sydänsähkökäyrää (EKG) tutkimuksen ajan. Ennen rasitusvaihetta mittaamme sinulta makuulla sekä istuen verenpainetta, sekä teemme keuhkojen toimintaa mittaavia puhalluskokeita (spirometria).

Tutkimus suoritetaan yleisimmin polkupyörärasituksena lääkärin valvonnassa väsymystilaan/uupumiseen asti tai kunnes sinulle ilmaantuu sellaisia oireita, jotka pakottavat keskeyttämään kokeen. Rasituksen aikana seuraamme sydänsähkökäyräsi ja veren happitasoa, mittaamme verenpainetta ja kirjaamme mahdolliset oireesi ylös. Hengitystäsi arvioimme kasvoillesi asetettavalla maskilla, joka analysoi hengityskaasuja ja mittaa hengitystilavuuksia. Polkemisaika on keskimäärin kymmenen minuuttia.

Rasituksen jälkeinen palautumisvaihe kestää vähintään kuusi minuuttia, ja hengityksesi, sydänsähkökäyräsi ja verenpaineesi seuranta jatkuu edelleen. Palautumisvaiheen jälkeen teemme vielä spirometriapuhalluksia.

Miten kauan tutkimus kestää?

Tutkimus kestää noin 60 minuuttia.

Mistä saan kuulla tutkimustuloksista?

Tutkimustuloksista kuulet sinua hoitavalta osastolta tai poliklinikalta.

Ohje tarkistettu 7.9.2022