

Covid-19 varotoimet, epäilty tai varmistettu tapaus (kosketus- ja pisaravarotoimet)

Huom! Aerosolia tuottavissa (liman imu hengitysteistä, nebulisaattorihoito, bronkoskopia, intubaatio, resuskitaatio) käytetään lisäksi FFP2 tai 3-hengityksensuojaimia, hiussuojaa sekä suojalaseja tai kokokasvovisiiriä * käytössä ohje: [COVID-19 suojainten pukeminen ja riisuminen](#)

VIERAILIJA

Ilmoittaudu osastolla ennen potilas-huoneeseen menoa. Vierailut minimoidaan. Opastetaan käsihygienian toteuttamisessa ja suojainten käytössä.

KÄDET

Desinfektio käsihuuhteella aina.



SUU-NENÄSUOJUS (kirurginen)



SUOJATAKKI



SUOJALASIT TAI KASVOVISIIRI



SUOJAKÄSINEET



SIIVOUS/ DESINFEKTIO

Kloori 500 ppm
Muu: etanoli-pohjainen desinfektio.
Kertakäyttövälineet / huonekohtaiset.

POTILAAN KULJETTAMINEN

Kuljettaja käyttää suojaimia ohjeiden mukaan.
Kuljettaja desinfioi kätensä ennen ja jälkeen kuljetuksen.

Potilaalla kuljetuksen ajan tarpeen
kirurginen suunenäsuojus

Jokaisen hoitotoimenpiteen jälkeen potilashuoneessa poistetaan käsineet, kädet desinfioidaan ja vaihdetaan tarvittaessa puhtaat suojakäsineet.