

ERITETAHRADESINFEKTIO


Eritetahradesinfektion toteuttaminen on **jokaisen työntekijän vastuulla**. Veri- ja eritetahrat tulee poistaa välittömästi tahrain ilmaantumisen jälkeen ja aina ennen siivousta. Eritteissä on mikrobeille ravintoa, kosteutta ja suojaa, jolloin mikrobit pystyvät lisääntymään nopeastikin.

Pidä eritetahravälineet ja käyttöliuos valmiina esim. eritetahrapakissa

Käyttölaimennospullossa tulee olla merkittynä aineen nimi, laimennosvahvuus ja kelpoisuus aika (esim. viimeinen käyttöpäivämäärä.)

Käytettäessä valmiita käyttöliuoksia tulee pulloon merkitään käyttöönottopäivä.

Varmista liuoksen kelpoisuus ennen käyttöön ottoa.



Eritetahrain imeyttäminen (kaksivaiheinen)

Aktiiviklooriliuos 500 ppm: (Klorilli®)

Peroksygeeni: (Erisan Oxy+™ 2%, Oxivir® Execl™ 4,5%, Oxivir Plus® 3,5%)

Soveltuu sekä pienten että suurten eritealueiden poistamiseen ja desinfektioon

- Desinfioi kädet
- Laita kertakäyttökäsineet käteen.
- Poista eritetahrasta suurin osa imeyttämällä erite kertakäyttöiseen paperi-/siivouspyyhkeeseen ja laita pyyhe roskeen.
- Kaada puhtaalla käsineellä eriteisen alueen päälle riittävästi desinfektio- liuosta tai kostuta kertakäyttö paperi-/siivouspyyhe.
- Anna vaikuttaa hetki ja pyyhi huolellisesti puhtaalla kertakäyttö paperi-/siivouspyyhkeellä.
- Laita suojakäsineet ja käytetty pyyhe suoraan roskeen.
- Desinfioi kädet käsihuuhteella.

Eritetahrain suorapyyhintä (yksivaiheinen)

Aktiiviklooriliuos 5000 ppm : (Klorilli®)

Peroksygeeni: (Erisan Oxy+™ 5% liuos)

Soveltuu pienten eritemäärien tai roiskeiden poistamiseen ja desinfektioon.

- Laita kertakäyttökäsine käteen.
- Kaada käsineettömällä kädellä runsaasti desinfektio- liuosta suoraan tahraan tai kostuta kertakäyttö paperi-/siivouspyyhe, jolla desinfioit kontaminoituneen pinnan. Pyyhi pinta huolellisesti.
- Laita suojakäsine ja käytetty pyyhe suoraan roskeen.
- Desinfioi kädet käsihuuhteella.