

Glukoosikoe (Pt-Gluk-R5, 3716)

Tutkimuksesta käytetään myös nimiä "sokerirasitus" tai "glukoosirasitus". Koetta käytetään aivolisäkkeen erittämän kasvuhormonin erityksen häiriöiden tutkimisessa.

Valmistautuminen tutkimukseen

1. Ole ravinnotta edellisestä illasta kello 22:00 alkaen.
2. Paaston aikana saat tarvittaessa juoda vettä.
3. Kokeen aikana
 - et saa syödä (koskee myös purukumia ja pastilleja) tai juoda mitään muuta kuin kokeen yhteydessä annetun glukoosiliuoksen.
 - et saa tupakoida
 - välttä ruumiillista rasitusta
 - et saa poistua laboratorion läheisyydestä

Tutkimuksen suoritus

1. Kokeessa otetaan ensin verinäyte kyynärtaipeen laskimosta.
2. Tämän jälkeen annetaan juotavaksi testiannos rypälesokeriliuosta.
3. Liuoksen nauttimisen jälkeen otetaan uusia verinäytteitä kolmen tunnin aikana.

Kokeen tekemiseen kuluu aikaa noin 3 1/2 tuntia.

Voit ottaa glukoosikokeeseen liittyvissä kysymyksissä yhteyttä tutkimusta pyytäneeseen osastoon tai poliklinikkaan.

Vastausta voit tiedustella hoitavasta yksiköstä.

Katselmoitu 5.11.2021 PK