

Gynekologinen laserhoito

Laserhoidossa poistetaan emättimen esiastemuutos.

Hoitoa kuukautisten aikana pyritään välttämään. Ota yhteyttä, mikäli sinulla on runsasta veristä vuotoa hoidon ajankohtana. Jos käytät ehkäisypillereitä, voit kysyä neuvoa kuukautisten siirtämisestä sinua hoitavasta yksiköstä.

Valmistautuminen ja laserhoito

Voit ottaa tunti ennen toimenpiteeseen tuloa kipulääkkeen.

Laserhoidossa lasersäde haihduttaa muutosalueen emättimestä. Hoito tehdään poliklinikkakäynnillä [Kolposkopiitutkimuksen](#) yhteydessä, eikä sen jälkeen tarvita sairauslomaa. Aikaa käynnille on varattu noin 45–60 minuuttia.

Hoidon jälkeen kotona

Hoidon jälkeen voit tarvittaessa ottaa kipuun apteekista ilman reseptiä saatavaa kipulääkettä. **Tulehdus- ja vuotoriskin** vuoksi uimista, kylpyjä, yhdyntöjä sekä tamponien tai kuukuppien käyttöä tulee välttää kunnes mahdollinen jälkivuoto on loppunut.

Näytevastauksien kuulemisesta ja jatkoseurannasta sovitaan yksilöllisesti.

Mahdolliset ongelmat ja yhteystiedot

Ota yhteyttä sinua hoitavaan yksikköön, jos sinulle tulee hoidon jälkeen alavatsakipua, kuumetta tai runsasta, pahanhajuista jälkivuotoa. Oireet voivat olla merkki tulehduksesta.

Tyks Turku, Kantasairaala, Naistentautien poliklinikka puhelin 02 313 0320

- Sairaanhoidtaja maanantai–perjantai klo 9.00–12.00

Päivystysasioissa iltaisin ja viikonloppuisin, puhelin 02 313 1000