

Gynekologinen näyte

Gynekologisella näytteellä tarkoitetaan kohdun limakalvolta, kohdunsuulta ja/tai kohdunkaulakanavasta, emättimen seinämästä sekä ulkosynnyttimien alueelta otettuja näytteitä. Näyte otetaan poliklinikkakäynnin yhteydessä eikä vaadi erityistä valmistelua. Ohjeessa on täytettäviä kohtia.

Näytteitä ei mielellään oteta kuukautisten aikana.

() Papa- eli irtosolunäyte: Papa -kokeella etsitään kohdunkaulan solumuutoksia eli kohdunkaulansyövän esiasteita. Näyte otetaan puulastalla emättimestä ja kohdun suulta sekä harjalla kohdunkaulakanavasta.

() Koepala: Koepala voidaan ottaa ulkosynnyttimistä, emättimen seinämästä tai kohdunsuulta. Emättimen seinämä tai kohdunsuu ei ole kovin tuntoherkkä, joten puudutusta ei tarvita. Näyte otetaan koepalapihdillä ja näytteenottohetkellä voi tuntua pientä kipua.

Ulkosynnyttimistä otettavan koepalan ottokohta puudutetaan ennen koepalan ottamista.

() Kohdun limakalvonäyte: Kohdun limakalvonäytteellä selvitetään vuotohäiriöiden tai kohdun limakalvon muutosten syitä. Tutkimus täydentää ultraäänitutkimusta. Näyte otetaan kohdusta emättimen kautta ohuella näytteenottokateetrilla ja sen ottaminen kestää alle minuutin. Näytteenottoon voi liittyä hetkellistä kuukautiskivun kaltaista alavatsatuntemusta.

() Papilloomavirusnäyte: Papilloomavirusnäytteellä selvitetään suuren riskin papilloomavirus - tyyppien esiintymistä. Näyte täydentää muita kohdunsuun solumuutoksiin liittyviä tutkimuksia. Näyte otetaan harjalla kohdunkaulakanavasta.

Näytteenoton jälkeen

- Papa- ja papilloomavirusnäytteenoton jälkeen voi näytteenottopäivänä tulla hieman **veristä ruskeaa vuotoa**.
- Emättimen seinämän ja kohdunsuun koepalan sekä kohdun limakalvonäytteen oton jälkeen voi tulla niukkaa veristä vuotoa parin päivän ajan.
- Ulkosynnyttimien koepalanoton jälkeen ottokohdasta voi tulla veristä vuotoa muutaman päivän ajan. **Ottokohtaan muodostuu rupi**, jonka on hyvä **antaa irrota itsekseen**, minkä vuoksi alueen pyyhkiminen tulee tehdä painelemalla.

Vuodon aikana on hyvä välttää yhdyntää, tamponien tai kuukuppien käyttöä, uimista sekä amme- ja istumakylpyjä tulehdusriskin vuoksi.

Tutkimustulokset

Näyte lähetetään patologille tutkittavaksi. Vastaukset valmistuvat 3 viikon kuluessa. Vastausten kuulemisesta sovitaan kanssasi yksilöllisesti.

Yhteydenotto

Jos jälkivuoto muuttuu runsaammaksi tai pahanhajuiseksi, tulee alavatsakipua tai lämpöä, ota yhteyttä tutkimuksen tehneeseen sairaala.