

Gynekologinen sähkösilmutkahoito

Sähkösilmutkahoidossa (LEEP) poistetaan kohdunsuun esiastemuutos.

Ajanvaraus

Aika hoitoon lähetetään sinulle kirjeitse tai se sovitaan poliklinikkakäynnin yhteydessä. **Hoitoa kuukautisten aikana pyritään välttämään.** Sinun tulee ottaa yhteyttä, mikäli sinulla on runsasta veristä vuotoa.

Jos käytät **ehkäisytabletteja, jatka niiden käyttöä ilman taukoa** siten, että toimenpiteen jälkeen jää vuodotonta aikaa vähintään 2 viikkoa, mieluiten 4 viikkoa. Voit kysyä neuvoa kuukautisten siirtämisestä sinua hoitavasta yksiköstä.

Sähkösilmutkahoito

Ota tuntia ennen toimenpiteeseen tuloa kipulääke. Hoito ei vaadi jälkiseurantaa sairaalassa eikä sairauslomaa.

Sähkösilmutkahoidossa muutosalueen paikallistamiseksi käytetään kolposkooppia ja etikka- ja jodivärjäyksiä, minkä jälkeen kohdunsuu puudutetaan. Muutosalue poistetaan sähkösilmutkalla. Hoidon aikana voit tuntea kuukautiskivun kaltaista lievää tuntemusta. Poistettu pala lähetetään patologille tarkempaa tutkimusta varten.

Hoidon jälkeen kotona

Kotona voi tuntua vielä lievää kipua, siihen voit ottaa tarvittaessa apteekista reseptittä saatavaa kipulääkettä.

Sähkösilmutkahoidon jälkeen esiintyy yleensä hieman veristä vuotoa, joka muuttuu myöhemmin ruskeaksi. Hoidetulle alueelle syntyy **rupi, joka irtoaa noin 1 - 2 viikon kuluessa toimenpiteestä ja silloin saattaa tulla runsaampaa veristä vuotoa.** Uimista, amme ja -istumakylpyjä, yhdyntöjä sekä tamponien tai kuukuppien käyttöä tulee välttää seuraaviin kuukautisiin asti **tulehdus- ja vuotoriskin vuoksi.**

Jatkoseuranta

Näytevastauksien kuulemisesta ja mahdollisesta jatkohoidosta sovitaan yksilöllisesti.

Ota yhteyttä sinua hoitavaan yksikköön, jos jälkivuoto muuttuu runsaaksi tai pahanhajuiseksi, tulee alavatsakipua tai kuumetta.