

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAHOITOPIIRI

HELICOBACTER PYLORI, ANTIGEENIN OSOITUS ULOSTEESTA (F-HepyAg, 3952)

Tarvittavat välineet:

- Muovi- tai pahviastia
- Ulostenäytepurkki (Kuva 1), jonka saat laboratorion
- Muovipussi ja nimitarra



Kuva 1

Näytteenotto

1. Ulosta muovi- / pahviastian tai WC – paperiin.
 2. Avaa ulostenäytepurkki ja laita purkin kannessa kiinni olevalla lastalla noin teelusikallinen ulostetta purkkiin (ei purkkia täyteen!).
 3. Sulje purkki huolellisesti.
 4. Huolehdi, ettei näytettä tule purkin ulkopuolelle.
 5. Kirjoita nimi, henkilötunnus, näytteenottopäivämäärä ja kellonaika mukana tullessaan nimitarraan.
 6. Kiinnitä nimitarra näytepurkkiin ja laita näytepurkki muovipussiin.
 7. Toimita näytepurkki laboratorioon saman päivän aikana.
- Huom! Näyte on säilytettävä jääkaappilämpötilassa, mutta se voidaan lähettää laboratorioon huoneenlämmössä. Näyte säilyy analysointikelpoisena 3 vrk:n ajan.

Näytteenoton rajoitukset

- Jos ulostenäyte otetaan helikobakteerin häättöhoitoon onnistumisen varmistamiseksi, lääkityksen loppumisesta pitää olla kulunut vähintään 4 viikkoa.
- Tutkimusta ei voida tehdä ripuliulosteesta.
- Seuraavien lääkkeiden käyttö on kielletty kaksi viikkoa ennen tutkimusta
 1. Kaikki antibiootit
 2. Protonipumpun estäjät
 - lansopratsoli (Gasterix, Lanrec, Lansoprazol, Lantil, Lanvone, Zolt, Helipak)
 - omepratsoli (Losec, Omeprazol, Omestad)
 - pantopratsoli (Pantoloc, Pantoprazol, Panzor, Somac)
 - rabepratsoli (Pariet, Rabeprazol)
 - esomepratsoli (Esomeprazol, Nexium)

Näytteen ottamiseen liittyvissä ongelmissa voi ottaa yhteyttä tutkimusta pyytäneeseen osastoon tai poliklinikkaan.

Vastausta voi tiedustella hoitavasta yksiköstä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • www.vsshp.fi • Vaihde 02 313 0000

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.