

Helicobacter pylori, antigeenin osoitus ulosteesta (F-HepyAg, 3952)

Tarvittavat välineet:

- Muovi- tai pahviastia
- Ulostenäytepurkki (Kuva 1), jonka saat laboratorion
- Muovipussi ja nimitarra



Kuva 1

Näytteenotto

1. Ulostaa muovi- / pahviastiaan tai WC – paperiin.
2. Avaa ulostenäytepurkki ja laita purkin kannessa kiinni olevalla lastalla noin teelusikallinen ulostetta purkkiin (ei purkkia täyteen!).
3. Sulje purkki huolellisesti.
4. Huolehdi, ettei näytettä tule purkin ulkopuolelle.
5. Kirjoita nimi, henkilötunnus, näytteenottopäivämäärä ja kellonaika mukana tullessaan nimitarraan.
6. Kiinnitä nimitarra näytepurkkiin ja laita näytepurkki muovipussiin.
7. Toimita näytepurkki laboratorioon saman päivän aikana.

Huom! Näyte säilyy analysointikelpoisena jääkaappilämpötilassa 3 vrk:n ajan. Näyte voidaan lähettää laboratorioon huoneenlämmössä. Pidempää säilytystä varten näyte on säilytettävä ja lähetettävä pakastettuna.

Näytteenoton rajoitukset

- Jos ulostenäyte otetaan helikobakteerin häätöhoidon onnistumisen varmistamiseksi, lääkityksen loppumisesta pitää olla kulunut vähintään 4 viikkoa.
- Tutkimusta ei voida tehdä ripuliulosteesta.

- Seuraavien lääkkeiden käyttö on kielletty kaksi viikkoa ennen tutkimusta
 - Kaikki antibiootit
 - Protonipumpun estäjät
 - ansopratsoli (Gasterix, Lanrec, Lansoprazol, Lantil, Lanvone, Zolt, Helipak)
 - omepratsoli (Losec, Omeprazol, Omestad)
 - pantopratsoli (Pantoloc, Pantoprazol, Panzor, Somac)
 - rabepratsoli (Pariet, Rabeprazol)
 - esomepratsoli (Esomeprazol, Nexium)

Näytteen ottamiseen liittyvissä ongelmissa voi ottaa yhteyttä tutkimusta pyytäneeseen osastoon tai poliklinikkaan.

Vastausta voi tiedustella hoitavasta yksiköstä.

Katselmoitu 26.7.2020/MG.