

Kamerakapselitutkimus

Kamerakapselitutkimuksessa kuvataan ruoansulatuskanava ja se soveltuu parhaiten ohutsuolen tutkimiseen. Se ei korvaa mahalaukun eikä paksusuolen tähystystä.

Saat nieltäväksi ison vitamiinipillerin kokoisen kamerakapselin, joka kulkee suoliston läpi ottaen samalla kuvia. Kuvat välittyvät vatsan päälle asetetun anturivyön kautta tallennuslaitteeseen. Lääkäri tutkii tallennetun kuvatuloksen tietokoneohjelman avulla. Ota yhteyttä tutkimuspaikkaan, jos olet tai epäilet olevasi raskaana.

Kaksi viikkoa ennen tutkimusta

- Mikäli käytät rautalääkitystä (esim. Obsidan®, Retafer®, Maltofer®), pidä taukoa kaksi viikkoa ennen kamerakapselitutkimusta.

Tutkimusta edellisenä päivänä

- Lopeta kiinteän ruuan syöminen kello 12, mutta juo runsaasti esim. vettä, kahvia, teetä, liha/kasvislientä, mehuja jotka eivät sisällä hedelmälihaa, mehukeittoa tai apteekista saatavia täydennysravintovalmisteita.
- Aloita kello 17-21 Colonsteril® -tyhjennysaineiden ottaminen (osta apteekista 2 tölkkiä). Sekoita molempien tölkkien sisältö kahteen litraan vettä ja juo kaikki 2 litraa.
- Ole syömättä ja juomatta 8 tuntia ennen tutkimusta.

Tutkimuspäivänä

- Voit ottaa lääkärin määräämät lääkkeet veden kanssa 2 tuntia ennen tutkimusta.
- Diabeteslääkkeistä neuvottele lääkärin kanssa.
- Pue kotona päällesi pehmeä aluspaita/T-paita, jonka päälle anturivyö laitetaan. Kaksiosaiset vaatteet (esim. housut tai hame ja paita) helpottavat anturivyön asennusta.

Tutkimuksen kulku

- Poliklinikalla saat kamerakapselin, jonka nielaiset veden kanssa.
- 1 - 2 tunnin kuluttua tarkistetaan kamerakapselin sijainti tallennuslaitteesta. Tämän jälkeen voit mennä kotiin. Asiasta neuvotellaan tapauskohtaisesti. Palauta kamerakapselilaitteisto poliklinikalle viimeistään kello 15.00 tai muuna sovittuna aikana. Laitteiston voi myös palauttaa seuraavana päivänä.
- Saat juoda 2 tunnin kuluttua (ei kahvia eikä kolajuomia)
- Saat syödä 4 tunnin kuluttua kevyen välipalan. Voit ottaa eväät mukaan.

- Mikäli sinulle tulee tutkimuksen aikana kotona vatsakipuja tai pahoinvointia, palaa heti poliklinikalle.
- Laitteistoa ei saa irrottaa tutkimuksen aikana, eikä se saa kastua.
- Varmista 15 minuutin välein, että tallentimen yläosan sininen merkkivalo vilkkuu. Mikäli valo lopettaa vilkkumisen, merkitse kellonaika muistiin ja palaa poliklinikalle.

Tutkimuksen jälkeen

- Kamerakapseli poistuu elimistöstä ulosteen mukana kolmen vuorokauden kuluessa. Jos kapseli ei jostain poikkeuksellisesta syystä poistu luonnollista tietä, se poistetaan tähtystoimenpiteen tai leikkauksen avulla.
- Mikäli sinulle on tulossa magneettikuvaus, ota yhteyttä tutkimusyksikköön. Magneettikuvausta ei saa tehdä, jos kamerakapseli ei ole poistunut. Seurauksena voi olla vakavia suolisto- tai vatsaontelovaurioita.

Ota yhteyttä hoitavaan yksikköön tai päivystysaikana yhteispäivystykseen, jos

- sinulla on vatsakipuja, oksentelua, ummetusta tai epäilet, että kapseli ei ole poistunut suolistosta kolmen vuorokauden kuluessa.