

KIVESKOHJUN SULKU

Kiveskohju eli varikosele on siemennuorapunoksen laskimoiden suonikohjusairaus, jossa kiveslaskimon läpät puuttuvat tai eivät pysty estämään takaisinvirtausta. Seurauksena on laskimolaajentumia eli suonikohjuja.

Kiveskohju löydetään yleensä sattumalta. Oireena voi olla kipua ja turvotusta kivespussissa. Kivespussin lämpötila on tavallista korkeampi ja siittiöiden tuotanto voi olla häiriintynyt.

Toimenpide

Kiveskohjujen sulkeminen eli embolisaatio tehdään röntgenosastolla. Röntgenlääkäri punktoi nivustaipeen laskimon, vie sen kautta kiveslaskimoon katetrin ja sulkee laskimon embolisoivalla aineella tai metalli- ja muovikierukoilla.

Toimenpiteen jälkeen

- Toimenpiteen jälkeen punktiokohdalla pidetään painoa röntgenlääkärimääräämään ajan. Vuodelevossa tulee olla muutamia tunteja.
- Kotiin pääset jo toimenpidepäivän iltana, mikäli vointi sen sallii.
- Sairaslomaa kirjoitetaan yleensä sairaalassaoloaika.
- Viikon ajan toimenpiteen jälkeen sinun tulee olla rauhallisesti ja välttää raskaita nostoja ja ponnisteluja.