

KIVESTEN HORMOONIA TUOTTAVAN OSAN POISTOLEIKKAUS

Eturauhasen syövän keskeisiä hoitomenetelmiä on mieshormonin tuotannon ehkäiseminen. Tähän tavoitteeseen päästään kemiallisella kastreatiolla tai poistamalla kiveksistä hormonia tuottava osa. Kivesten hormonituotannon loppuminen pienentää eturauhasta, parantaa virtsankulkua ja estää syövän etenemistä.

Leikkaus

Leikkaus tehdään tavallisimmin selkäydinpuudutuksessa. Leikkaushaava tulee kivespussiin. Sairaalassaoloaika on noin vuorokausi.

Kotihoito

- Leikkauksen jälkeisenä päivänä voit liikkua vapaasti, mutta leikkausalueen liiallista rasittamista tulisi välttää.
- Hygieniasta huolehtiminen on tärkeää. Haavaa voi suihkutella jo vuorokauden kuluttua leikkauksesta.
- Haavalla käytetään sulavia ompeleita, joten niitä ei tarvitse poistaa. Ompeleet sulavat itsestään noin kahden viikon kuluessa.
- Sinun tulee pitää tukevia alushousuja, sillä kivespussit voivat olla aluksi verenpurkaumien vuoksi turvoksissa ja sinertävän väriset. Tämä on täysin normaalia.
- Vältä raskasta fyysistä räsitusta ja urheilua 2 -3 viikon ajan.

Mieshormonitoiminnan vähentyessä seksuaalinen halukkuus ja erektiokyky heikkenevät. Alentunutta erektiokykyä voidaan hoitaa erilaisilla lääkkeillä ja apuvälineillä.

Kuumia aaltoja ja hikoilua esiintyy osalla potilaista. Lievää rintarauhasen turvotusta ja kipeytymistä saattaa esiintyä. Sivuvaikutusten hoitotarve arvioidaan myöhemmin urologin vastaanotolla.