

Klamydia

Klamydiatulehdus on yleisimpiä sukupuoliteitse tarttuvia tauteja, jonka aiheuttaa solunsisäinen bakteeri, Chlamydia trachomatis.

Klamydiatulehdus on usein oireeton

Klamydiatulehdus on naisilla useimmiten oireeton, myös moni mies sairastaa klamydiaa tietämättään. Jos oireita tulee, ne alkavat usein viikon tai parin sisällä tartunnasta. Oireet voivat myös alkaa paljon myöhemmin.

Naisen klamydiatulehduksen oireina ovat lisääntynyt valkovuoto ja virtsankirvely sekä alavatsa- ja selkäkivut.

Miehelle tulee virtsankirvelyä, tihentynyttä virtsaamistarvetta sekä limaista tai märkäistä vuotoa.

Hoitamaton klamydiatulehdus voi edetä lisäkivestulehdukseksi tai sisäsynnytintulehdukseksi, joka saattaa aiheuttaa lapsettomuutta tai kohdunulkoisen raskauden.

Klamydia voi aiheuttaa myös silmätulehduksen ja jälkitautina niveltulehdusta. Vastasyntynyt voi saada synnytyskanavasta klamydiatartunnan, josta aiheutuu silmätulehdus tai keuhkokuume.

Miten klamydia todetaan?

Klamydia todetaan naisilla kohdunkaulakanavasta tai virtsasta otettavalla näytteellä. Miehellä tulehdus todetaan virtsanäytteestä.

Hoito

Klamydia hoidetaan suun kautta otettavilla antibiooteilla.

Hoito on tartuntatautilain mukaan ilmaista yleisissä sairaaloissa ja terveyskeskuksissa.

Kumppanin samanaikainen hoito on erittäin tärkeää. Klamydiaa sairastava on velvollinen ilmoittamaan taudista kumppaneilleen ja kehottamaan näitä hakeutumaan tutkimuksiin.

Kondomia on käytettävä, kunnes jälkitarkastus on tehty.