

Kohtuontelon tutkimus eli hysterosonografia

Kohtuontelon- eli hysterosonografiatutkimus (HSG) tutkimus täydentää gynekologista ultraäänitutkimusta. Tutkimuksen avulla voidaan todeta mahdolliset kohtuontelon poikkeavuudet kuten väliseinät, myoomat (lihaskasvaimet) ja polyyypit (limakalvopoimut).

Kohtuontelon tutkimus ei edellytä erityisiä valmisteluita. Se tehdään usein poliklinikkakäynnin yhteydessä, mielellään kuukautiskierron alkupuolella. **Kuukautisvuodon aikana tutkimusta ei voida tehdä.**

Tutkimuksen kulku

Kohtuonteloon viedään emättimen kautta ohut katetri, jonka kautta ruiskutetaan steriiliä huuhtelunestettä. Kohtuontelon laajeneminen voi tuntua lievänä kuukautiskivun kaltaisena tunteena. Nesteruiskutuksen aikana kohtuonteloa tutkitaan emättimen kautta ultraäänianturilla.

Tutkimuksen jälkeen

Samalla poliklinikkakäynnillä voidaan löydöksen perusteella sopia mahdollinen jatkohoito. Tutkimus itsessään ei edellytä jälkihoitoa. Tutkimuspäivänä emättimen kautta valuu ulos hieman verensekaista huuhtelunestettä, minkä vuoksi tulee käyttää sidettä.

Ota yhteyttä sinua hoitavaan yksikköön, jos jälkivuoto muuttuu runsaammaksi tai pahanhajaiseksi, tulee alavatsakipuja tai lämpöä.