

Kolposkopiatuskimus

Sinulle on varattu aika kolposkopiatuskimukseen, joka on ulkosynnyttimien, emättimen ja kohdunsuun muutoksen jatkotutkimus. Tutkimus tehdään, kun

- Irtosolukokeessa (Papa) on vahvoja tai toistuvia lieviä löydöksiä tai suuren riskin papilloomavirusnäyte on toistuvasti positiivinen.
- Ulkosynnyttimissä, emättimessä tai kohdunsuulla nähdään paljaalla silmällä poikkeavia muutoksia.
- Ulkosynnyttimissä on oireettomia, parantumattomia haavaumia.

Valmistautuminen tutkimukseen

Tutkimusta **ei tehdä kuukautisvuodon aikana**, koska veri häiritsee muutosten näkymistä. Mikäli sinulla on vastaanottoajankohtana kuukautiset, tulee sinun **siirtää tutkimusajankohtaa**.

Tutkimus

Lääkäri tarkastelee kolposkoopilla (mikroskooppi) mahdollista muutosaluetta. Tutkimuksessa käytetään ulkosynnyttimiin ja emättimeen mietoa etikkaliuosta, jotta mahdolliset muutos-alueet näkyisivät. Koepalojen ottaminen kohdennetaan muutosalueisiin. Tarvittaessa tutkimuksessa käytetään jodiliuosta. Sitä ei kuitenkaan käytetä **jodi -allergisille**.

Emättimen ja kohdunsuun **koepalojen ottaminen** aiheuttaa vain vähäisiä tuntemuksia, minkä vuoksi ne voidaan ottaa ilman puudutusta. Ennen ulkosynnyttimien koepalanottoa ottokohta puudutetaan.

Tutkimuksen jälkeen on normaalia, että käytetty etikkaliuos aiheuttaa kirvelyä limakalvoilla. Jodiliuos värjää terveet limakalvot tummanruskeaksi. Saat tarkemmat kotihoito-ohjeet vastaanottokäynnin yhteydessä.

Jatkohoito

Koepalavastaukset valmistuvat noin 3 viikon kuluttua. Vastausten perusteella saadaan varmistus mahdollisten solumuutosten asteesta ja suunnitellaan jatkohoito ja -seuranta. Vastausten kuulemisesta sovitaan yksilöllisesti.

Lue lisätietoa Gynekologisesta terveydestä ja Kohdunsuun irtosolu-eli PAPA -muutoksista www.terveyskyla.fi/ Naistalo.