

## Korvaleikkaus

### Tietoa korvaleikkauksesta

Korvaleikkaukseen voidaan päätyä monesta syystä. Tässä sinulle muutamia esimerkkejä:

- Kolestatoomatauti (helmiäiskasvain) kasvattaa korvassa kreatiinimassaa (hilsemassaa) ja lopulta syövyttää luuta välikorvassa ja korvalokerostossa.
- Äkillinen kartiolisäkkeen tulehdus on välikorvan tulehduksen komplikaatio. Tulehdus leviää kartiolisäkkeen lokeroihin täyttäen ne tulehduskudoksella.
- Otokleroositauti (luutumistauti) luuduttaa kuuloluut niin, etteivät ne toimi normaalisti. Tämä aiheuttaa kuulon alenemaa.
- Tärykalvon reikä, joka ei ole umpeutunut itsestään aiheuttaen kuulon alenemaa ja/tai tulehduskierteen.

Korvaleikkaus tehdään yleensä nukutuksessa. Otokleroosileikkaus voidaan tehdä myös puudutuksessa. Leikkaukseen tullaan yleensä ennalta sovittuna ajankohtana. Sairaalahoidon pituus riippuu tehdystä toimenpiteestä ja potilaan voinnista. Osa leikkauksista tehdään päiväkirurgisesti.

### Leikkauksen jälkeen sairaalassa

Nukutusaineet saattavat aiheuttaa sinulle pahoinvointia. Leikkauksen jälkeen voi tuntua myös kipua. Saat kipu- ja pahoinvointilääkitystä tarpeen mukaan.

Leikkauksen jälkeen korvassa saattaa olla tamponi tai tuppo, jonka tarkoitus on hillitä vuotoa ja tukea leikkaustulosta. Tamponia et saa ottaa itse pois, vaan se poistetaan jälkitarkastuksen yhteydessä.

### Jatkohoito kotona

Leikkauksen jälkeen korvassa voi kuulua rasahtelua ja tuntua kutinaa tai pientä pistelyä, mikä on normaalia. Leikatulla korvalla et myöskään kuule normaalisti, sillä korvassa on yleensä tamponi tai tuppo jälkitarkastukseen asti. Tamponiin, tuppoon tai korvalehdelle voi kertyä jonkin verran veristä eritettä, mikä on normaalia. Kuulosi tarkastetaan myöhemmin sovittuna ajankohtana.

Leikattua korvaa et saa puhdistaa itse. Lääkäri puhdistaa korvan jälkitarkastuksessa. Lääkäri poistaa myös mahdolliset tamponit ja ompeleet.

## Kotona sairausloman ajan tulee sinun välttää:

- raskaita ponnisteluja
- kumartumisia
- painavien esineiden nostelua
- saunomista
- lentomatkoja

Sinun tulee suojata korvat myös helteeltä, kovalta tuulelta ja pakkaselta. Normaali rauhallinen kävely ulkona on sallittua.

Niistäminen on kielletty niin kauan kunnes lääkäri antaa sinulle siihen luvan! Niistäminen aiheuttaa paineen nousua korvassa ja voi aiheuttaa vahinkoa leikkausalueelle. Korvia et saa myöskään koettaa puhaltaa auki nipistämällä nenä kiinni ja puhaltamalla ilmaa korviin.

Sinun tulee syödä leikkauksen jälkeen mahdollisesti aloitettu antibioottikuuri loppuun asti lääkemääräyksen mukaisesti. Kipulääkettä sinun kannattaa ottaa ensimmäisten päivien ajan säännöllisesti ohjeen mukaan, ja myöhemmin tarvittaessa.

Peseytymisen yhteydessä tulee sinun huolehtia, ettei leikattuun korvaan pääse vettä. Korva tulee suojata vedeltä noin kuukauden ajan leikkauksesta tai lääkärin määräämän ajan. Suojana käytetään korvakittiä tai esim. vaseliinissa pyöritettyä pumpulia, joka asetetaan korvakäytävän suulle, ei korvan sisään.

## Jälkitarkastus ja sairausloma

Tarvittavat lääkeresepit ja jälkitarkastusajat annetaan sinulle kotiutumisen yhteydessä. Yleensä ensimmäinen jälkitarkastus on noin viikon kuluttua leikkauksesta ja seuraava noin kuukauden kuluttua. Ensimmäisessä jälkitarkastuksessa poistetaan ompeleet ja mahdolliset tamponit. Kipulääkettä voit ottaa ennen jälkitarkastukseen tuloa. Sairausloman pituus sovitaan lääkärin kanssa tapauskohtaisesti.

## Mahdolliset ongelmat

Ota yhteyttä sinua hoitavaan sairaalaan, mikäli:

- Kuume nousee yli 38 asteen
- Haava punoittaa kuumottaa ja erittää
- Kipulääkkeet eivät auta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • [www.vsshp.fi](http://www.vsshp.fi) • Vaihe 02 313 0000

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.