

Lapsen paksusuolen läpikulun tutkimus eli gi-kanava, läpikulku

Tutkimuksella selvitetään paksusuolen toimintaa ummetuksen vuoksi.

Miten valmistaudut tutkimukseen?

Tutkimukseen lähettävältä yksiköltä saat lapselle annettavaksi varjoainemerkkirenkaita sisältävän Sitzmarks-kapselin, joka sisältää 10 kappaletta röntgenpositiivista polyvinylichloridi 0-rengasta.

Lapsen tulee nielaista kapseli 5 vuorokautta ennen tutkimusta aamupäivällä veden, mehun tai soseen kanssa. Kun lapsi on ottanut tutkimuksessa käytettävän kapselin, hänelle ei saa antaa ulostuslääkkeitä, peräruiskeita tai peräpuikkoja ennen röntgentutkimusta.

Kapselia ei tule ottaa maanantaina tai tiistaina, jolloin kuvaus osuisi viikonloppuun. Tutkimus ei vaadi syömättä tai juomatta olemista.

Miten tutkimus tehdään?

Viiden päivän kuluttua kapselin ottamisesta lapsen vatsasta otetaan aamupäivällä röntgenkuvia, joista nähdään kuinka paljon merkkirenkaita on jäljellä. Jos lapsi pelkää tutkimusta, on hänelle hyvä kertoa, ettei tutkimus satu lainkaan.

Mitä tutkimuksen jälkeen?

Tutkimuksen jälkeen lapsi saa syödä ja juoda normaalisti sekä käyttää jälleen mahdollisia ulostuslääkkeitä. Lähettävä yksikkö huolehtii tutkimustulosten kertomisesta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • www.vsshp.fi • Vaihde 02 313 0000

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.