

Lapsen peräsuolen varjoainekuvaus eli anografia

Tutkimuksella selvitetään peräsuolen toimintahäiriöitä ja ulostamisongelman syitä.

Miten valmistaudut tutkimukseen?

Lapsi ei saa käyttää peräsuoleen annettavia lääkkeitä, mekaanista tyhjennystä, peräruiskeita ja suun kautta otettavia ulostuslääkkeitä ainakaan kolmeen vuorokauteen ennen tutkimusta. Mikäli mahdollista, niiden käyttö tulisi lopettaa jo viikkoa ennen tutkimusta. Tutkimusta varten ei tarvitse olla ravinnotta.

Miten tutkimus tehdään?

Tutkimuksessa röntgenvarjoaine annetaan peräruiskeen tapaan. Röntgenlääkäri ottaa kuvia varjoaineen antamisen aikana ja sen jälkeen.

Tutkimus kestää yleensä noin 60 minuuttia. Joskus viimeinen jälkikuva voidaan ottaa vasta seuraavana aamuna, kun vatsa on toiminut. Tällöin tullaan kotoa käsin uudestaan seuraavana päivänä kuvaukseen.

Mitä tutkimuksen jälkeen?

Tutkimuksen jälkeen lapsi saa syödä ja juoda normaalisti sekä käyttää jälleen mahdollisia ulostuslääkkeitä. Lähettävä yksikkö huolehtii tutkimustulosten kertomisesta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • www.vsshp.fi • Vaihde 02 313 0000

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.