

Lapsen subclaviakanyylin hoito

Välineet

- Maski
- Tehdaspuhtaat käsineet
- Steriilit käsineet
- Ihon desinfektioainetta
- Steriilejä taitoksia ja/tai – pumpulipuikkoja
- Steriili suojakalvo tai puhdistava i.v. -suojasidos

Toimintaohjeet

1. Aseta maski kasvoille
2. Pese ja desinfioi kädet
3. Poista vanhat sidokset tehdaspuhtain käsinein
4. Kostuta steriilit taitokset ja/tai – pumpulipuikot desinfektioaineella (taitokset muovikalvo alaspäin)
5. Desinfioi kädet ja vaihda steriilit käsineet
6. Puhdista punktiokohta, subclavialetku ja letkun kiinnityskohdat varovasti
7. Aseta kanyylin päälle suojaksi läpinäkyvä kalvo tai puhdistava i.v. -suojasidos

Vaihda subclaviakanyylin peittävät sidokset ja puhdista juuri 3-5 päivän välein. Kanyyli puhdistetaan myös tarvittaessa useammin, jos sidokset ovat kastuneet, likaantuneet tai repsottavat.

Huuhto subclaviakanyyli joka päivä 3 ml:lla hepariinia (Heparin LEO 100 KY/ml) käyttäen 10ml ruiskua. Vaihda letkut ja 3-tiehanat joka toinen päivä, poikkeuksena kantasolusiirtopotilailla joka päivä.