

Lihassaitiopaineen mittaaminen

Miksi tutkimus tehdään?

Tutkimuksella selvitämme, onko lihasta ympäröivän aition paine koholla. Liian korkea paine aitiassa heikentää lihaksen verenkiertoa. Tämä johtaa lihaksen hapenpuutteeseen, jolloin seurauksena on lihaskipu. Tutkimus tehdään joko säären tai pohkeen lihasaitiosta.

Miten valmistaudun tutkimukseen?

Tutkimusta varten ei tarvita erityisiä esivalmisteluita. Kireitä vaatteita ei suositella, jotta tutkittava lihas olisi helpompi riisua esille.

- Ota mukaan liikuntaan/kävelyyn sopivat kevyet housut (esim. verryttelyhousut) sekä lenkkikossu-tyyppiset jalkineet.
- Tutkittavan lihasaitioalueen kohdalta ihon tulee olla täysin terve.
- Tutkimusta ei tehdä, mikäli sinulla on tilapäisen tulehdussairauden (esim. flunssa) oireita.

Miten tutkimus tehdään?

Tutkimuksessa pyritään esim. juoksumattorasituksella provosoimaan alaraajaan sinulle tyypillinen kipu/oire. Kivun ilmaannuttua, molempien säärien/pohkeiden lihasaitioon viedään neulan avulla paineanturi, jolla mitataan lihasaitioiden sisäistä painetta yhtäaikaaisesti kummastakin jalasta. Paineen mittaaminen tapahtuu makuulla levossa ja kestää noin kuusi minuuttia. Ihoon jäävä pieni pistosjälki puhdistetaan ja suojataan steriilillä laastarilla. Laastarin saa poistaa iholta seuraavana päivänä.

Miten kauan tutkimus kestää?

Tutkimus kestää noin 1 – 1,5 tuntia.

Mistä saan kuulla tutkimustuloksista?

Tutkimustuloksista kuulet sinua hoitavalta osastolta tai poliklinikalta.