

## Pisaraeristys tai pisaravarotoimet

Pisaravarotoimien (aikaisemmin pisaraeristys) tavoitteena on katkaista pisaroiden välityksellä tapahtuva tartunta. Tartunnan levittäjinä toimivat potilaan hengitysteistä ympäristöön lentävät pisarat (>5µm), joita syntyy yskiessä, niistäessä, puhuessa, aivastaessa tai aerosolia muodostavissa toimenpiteissä. Tartuntaan tarvitaan yleensä läheinen kosketus, koska pisarat eivät lennä eivätkä kulkeudu ilman mukana kauas, vain noin 1- 1.5 metrin päähän.

Pisaravarotoimissa olennaista on opettaa potilaalle oikea yskimishygieneia ja sijoittaa potilas yhden hengen huoneeseen tai vähintään 1.5m päähän toisesta potilaasta. Jos pisaravarotoimin hoidettavaa potilasta hoidetaan samassa potilashuoneessa muiden potilaiden kanssa, sijoitetaan potilassänky 1.5 m päähän viereisestä potilassängystä ja sängyn vieressä oleva väliverho/-sermi pidetään kiinni. Potilaalle kerrotaan pisaravarotoimista ja sen tarkoituksesta. Vierailijoita ja potilasta opastetaan toteuttamaan hyvää käsihygieneia. Potilasta ohjataan yskimään ja aivastamaan kertakäyttöliinaan.

**Potilaan läihoidossa** ja esimerkiksi potilashuoneen siivouksen yhteydessä käytetään aina **kirurgista suu-nenäsuojainta**. Lisäksi aina noudatetaan **tavanomaisia varotoimia**. Tämä tarkoittaa sitä, että jos potilas yskii, aivastelee tai on limainen, käytetään suojatakkaa/ -esiliinaa työvaatteen suojana ja silmien suojainta tavanomaisten varotoimien mukaisesti.

Pisaraeristyksestä tiedotetaan hoitoon osallistuvia laittamalla huoneen oveen keltainen **varotoimista kertova kortti, pisaravarotoimet**. Tulostettava kortti löytyy hoito-ohjeet.fi sivulta: <https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Eristyskortti,%20pisaraeristys.pdf>  
Jos potilaalle tehdään toimenpiteitä osaston ulkopuolella tai hänen siirtyessä toiseen hoitopaikkaan tiedotetaan pisaravarotoimista.

**Huoneeseen** varataan aina vain hoidossa tarvittavat hoito-, tutkimus- ja apuvälineet. Sulkutilaan tai huoneen ulkopuolelle varataan läihoidossa tarvittavat suojaimet. Osasto varaa näytteen ottoa varten potilashuoneeseen tai sulkutilaan staassin ja riittävän suuren särmäjäteastian. Sulkutilaan varataan desinfektioainetta ja puhdistusliinoja.

**Potilaskuljetuksissa** kuljettaja desinfioi kätensä ennen ja jälkeen potilaan kuljetuksen. Kuljettaja käyttää suojakäsineitä vain eritekontaktissa. Suojakäsineet riisutaan potilaan koskettamisen jälkeen suoraan roskapussiin ja kädet desinfioidaan. Suojatakkaa ja suu-nenäsuojasta potilaskuljetus käyttää tavanomaisten varotoimien mukaisesti. Potilas käyttää kirurgista suu-nenäsuojainta kuljetuksen ajan.

Sairaalahygieniestä syistä **ruokailuvälineinä** ei tarvitse käyttää kertakäyttöastioita. Roskat ja tarjottimille jääneet nesteet poistetaan tarjottimelta eristys huoneessa. Potilas desinfioi kädet ennen ruokailun aloittamista.

**Laboratorionäytteitä** tilattaessa näytteenottopyyntöön kirjataan pisaraeristys-/ varotoimet. Näyteputket/-purkit pyyhitään alkoholilla (vähintään 70 %) näytteiden oton jälkeen. Nimitarrat kiinnitetään näyteputkiin/-purkkeihin sulkutilassa tai huoneen ulkopuolella.

**Potilasasiakirjoja tai kiertokärryä** ATK-välineistöineen ei viedä potilashuoneeseen. Potilashuoneissa sekä tutkimus- ja toimenpidehuoneissa olevat kiinteät ATK-näppäimistöt ja muoviosat pyyhitään desinfektioaineella (esimerkiksi Easydes®- tai OL®). Näyttö pyyhitään kuivalla pyyhkeellä.

**Huolellinen loppusiivous** potilashuoneeseen tehdään potilaan siirtyessä pois sairaalasta, huoneen vapautuessa tai varotoimien päättyessä. Huoneessa olleet kertakäyttövälineet laitetaan jätteisiin ja monikäyttöiset välineet desinfioidaan. Tehdään eritetahradesinfektio eritteille. Huoneen lattia pyyhitään yleispesuaineella. Huoneen tasopinnat, kosketuskohdat pyyhitään joko yleispesuaineella tai soveltuvalla desinfektioaineella (esim. kloori 500 ppm tai peretikkahapot 2 %). Potilashuoneen välisärmit pyyhitään desinfektioaineella tai moni-/ kertakäyttöiset verhot vaihdetaan uusiin. Ikkunoissa olevia verhokappoja ei tarvitse pestä jokaisen potilaan välillä, jos niissä ei ole roiskeita/näkyvää likaa. Siivouksen jälkeen huoneen voi ottaa heti käyttöön.

**Tilanteet, joissa tarvitaan pisaravarotoimien lisäksi myös muita varotoimia** ovat mm. RSV, enterovirusinfektio, influenssavirus, SARS, MERS, verenvuotokuumeet tai niiden epäily. Näistä on erilliset ohjeet [hoito-ohjeet.fi](https://hoito-ohjeet.fi/fi/hoito-ja-tutkimukset-haku?Termi=6f55965a-232f-4ad7-a49c-61ecbb089586&Sairaanhoitopiiri=VSSHP) –sivustolla: <https://hoito-ohjeet.fi/fi/hoito-ja-tutkimukset-haku?Termi=6f55965a-232f-4ad7-a49c-61ecbb089586&Sairaanhoitopiiri=VSSHP>

Pisaravarotoimet eivät saa olla esteenä tai hidastaa potilaan hoidon edellyttämiä tutkimuksia, kuntoutusta, toimenpiteitä tai toiseen hoitolaitokseen siirtymistä.

Seuraavilla sivuilla ohjekortit kuhunkin pisaravarotoimi - tilanteeseen.

## PISARAVAROTOIMET

Huonesijoitus: yhden hengen huone, jossa oma WC ja suihku. Sulkutila suositeltava. Epidemiatilanteissa tarvittaessa kohortointi eli samaa tautia sairastavien sijoittaminen samaan huoneeseen.

- **Kirurginen suu-nenäsuojain**, lähihoidossa ja aina oltaessa < 1,5 metrin etäisyydellä potilaasta
- **Suojatakki/Suojaesiliina** tavanomaisten varotoimien mukaan, jos potilaskontaktissa eriteroiskevaara.
- **Silmäsuojain** tavanomaisten varotoimien mukaan, jos potilaskontaktissa eriteroiskevaara.
- **Suojakäsineet** tavanomaisten varotoimien mukaan kosketeltaessa kehon nesteitä, eritteitä, limakalvoja tai rikkinäistä ihoa.

Huoneeseen mentäessä ja sieltä poistuttaessa sekä suojainten riisumisen jälkeen desinfioidaan kädet (20–30 s.).

| Taudin aiheuttaja   | Eristyksen kesto/muuta huomioitavaa    | Siivous, pyykkit ja jätteet  | Tutkimus- ja hoitotarvikkeet, viihdytysvälineet ja lelut  |
|---|--|--|---|
| <b>Hinkuyskä</b><br>(pertussis)   | 5 päivää tehokkaan hoidon alusta       | Siivotaan huoneista viimeisenä. Siivousvälineet desinfioidaan käytön jälkeen. Siivousliinat ovat kertakäyttöisiä.                              | Sulkuun/huoneeseen varataan potilaskohtaiset näytteenottovälineet (staassi, särmä-jäteastia)                        |
| <b>Haemophilus influenzaen aiheuttama</b><br>- epiglottiitti<br>- pikkulapsilla pneumonia | 24 tuntia tehokkaan hoidon alusta      | Kosketus- ja tasopinnat saniteettitilat sekä käsienpesu- ja kaatoaltaat puhdistetaan päivittäin <b>heikosti emäksinen yleispuhdistusaine</b> . | Huone- ja potilaskohtaiset hoito- ja tutkimusvälineet (stetoskooppi, verenpaine- ja kuumemittari)                   |
| <b>Meningokokki pneumonia</b>   | 24 tuntia tehokkaan lääkehoidon alusta | <b>Eritetahradesinfektio</b> välittömästi tahran ilmaantumisen jälkeen.  | Eristyksen päätyttyä tai tuotaessa välineitä pois huoneesta, ne desinfioidaan huolellisesti desinfiointivälineessä. |
| <b>Parainfluenssa</b>   | Oireiden kesto                         | <b>Pyykki:</b> Huonekohtainen keräily. Vältetään vuodevaatteiden pölyttämistä.   | Lämpöherkät välineet pyyhitään desinfektioaineella esim. <b>vähintään 60 % alkoholi</b> .                           |
| <b>Rhinovirus</b><br>pikkulapsilla  | Oireiden kesto                         | <b>Jätteet:</b> Huonekohtainen keräily jätteen mukaisesti.   | Erityistä huomiota kiinnitetään esim. monitorien, näppäimistöjen ja kaukosäätimien pyyhintään.                      |
| <b>Streptokokki A:n aiheuttama</b><br>- faryngiitti<br>- pneumonia                        | 24 tuntia tehokkaan hoidon alusta      | <b>Huolellinen loppusiivous</b><br>Väli- ja suihkuverhot laitetaan pesuun ja vaihdetaan uusiin.  | Kertakäyttövälineet laitetaan jätteisiin.   |

## PISARAVAROTOIMET

Huonesijoitus: yhden hengen huone, jossa oma WC ja suihku. Sulkutila suositeltava Epidemiatilanteissa tarvittaessa kohortointi.

- **Kirurginen suu-nenäsuojain**, lähihoidossa ja aina oltaessa < 1,5 metrin etäisyydellä potilaasta
- **Silmäsuojain** tavanomaisten varotoimien mukaan, jos potilaskontaktissa eriteroiskevaara.
- **Suojatakki/Suojaesiliina** tavanomaisten varotoimien mukaan, jos hoitotoimenpiteissä eriteroiskevaara.
- **Suojakäsineet** tavanomaisten varotoimien mukaan kosketeltaessa kehon nesteitä, eritteitä, limakalvoja tai rikkinäistä ihoa.

Huoneeseen mentäessä ja sieltä poistuttaessa sekä suojainten riisumisen jälkeen desinfioidaan kädet (20–30 s.).

| Taudin aiheuttaja   | Eristyksen kesto/muuta huomioitavaa                      | Siivous, pyykki ja jätteet   | Tutkimus- ja hoitotarvikkeet, viihdytysvälineet ja lelut   |
|---|--|--|--|
| <b>Haemophilus influenzaen aiheuttama</b><br>- meningiitti<br>- sepsis  | 24 tuntia tehokkaan hoidon alusta                        | Siivotaan huoneista viimeisenä. Siivousvälineet desinfioidaan käytön jälkeen. Siivousliinat ovat kertakäyttöisiä.  | Sulkuun/huoneeseen varataan potilaskohtaiset näytteenottovälineet (staassi, särmä-jäteastia)   |
| <b>Meningokokki-sepsis,</b><br><b>Meningokokki meningiitti</b> ( <i>neisseria meningitidis</i> )                            | 24 tuntia tehokkaan lääkityksen alusta                   | Kosketus- ja tasopinnat saniteettitilat sekä käsienpesu- ja kaatoaltaat puhdistetaan päivittäin <b>heikosti emäksinen yleispuhdistusaine</b> .                     | Huone- ja potilaskohtaiset hoito- ja tutkimusvälineet (stetoskooppi, verenpaine- ja kuumemittari)  |
| <b>Sikotauti</b> (parotiitti)   | 9 päivää turvotuksen alusta                              | <b>Eritetahradesinfektio</b> välittömästi tahran ilmaantumisen jälkeen.  | Eristyksen päätyttyä tai tuotaessa välineitä pois huoneesta, ne desinfioidaan huolellisesti desinfiointivälineillä huuhtelulaitteessa.     |
| <b>Streptokokki, A-ryhmän (str. pyogenes) aiheuttama</b><br>- tulirokko<br>pikkulapsilla<br>- vakava<br>invasiivinen sepsis | 24 tuntia tehokkaan hoidon alusta                        | <b>Pyykki:</b> Huonekohtainen keräily. Vältetään vuodevaatteiden pölyttämistä.   | Lämpöherkät välineet pyyhitään desinfektioaineella esim. <b>vähintään 60 % alkoholi</b> .  |
| <b>Vihurirokko</b> (rubella)  | 7 päivää ihottuman alusta.<br>Ei-immuunin työntekijän ei | <b>Jätteet:</b> Huonekohtainen keräily jäteohjeiden mukaisesti.<br><b>Huolellinen loppusiivous</b><br>Väli- ja suihkuverhot laitetaan pesuun ja vaihdetaan uusiin. | Eriyistä huomiota kiinnitetään esim. monitorien, näppäimistöjen ja kaukosäätimien pyyhintään.<br>Kertakäyttövälineet laitetaan jätteisiin. |

|  |                          |  |  |
|--|--------------------------|--|--|
|  | tulisi hoitaa potilasta. |  |  |
|--|--------------------------|--|--|

## PISARA- ja KOSKETUSVAROTOIMET kausi-influenssa

| <p>Huonesijoitus, ensisijaisesti yhden hengen huone, jossa oma WC ja suihku, sulku-tila suositeltava</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jos joudutaan sijoittamaan samaan huoneeseen toisen potilaan kanssa, on vuoteiden väli oltava &gt; 1,5 m.</li> <li>- Osastoilla, joissa pääasiallisesti hoidetaan riskiryhmien potilaita (esim. hematologia, obstetriikka, onkologia, nefrologia), influenssa-oireiset sijoitetaan eristys-huoneisiin (oma wc ja suihku) tai heille erikseen erotettuun osaston osaan (kohortti).</li> <li>- Esim. eri A –influenssa- alatyyppejä sairastavat voidaan kohortoida samaan huoneeseen.</li> </ul> <p>Potilas ei saa poistua huoneesta kuin tutkimuksia ja hoitoja varten.</p> |   |  |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kirurginen suu-nenäsuojain</b> kliinisessä tutkimuksessa ja läihoidossa</li> <li>• <b>Silmäsuojain</b> tavanomaisten varotoimien mukaan, kun vaara eriteroiskeista</li> <li>• <b>Suojatakki tai suojaesiliina</b>, kliinisessä tutkimuksessa ja läihoidossa</li> <li>• <b>Suojakäsineet</b>, koskettaessa potilasta ja/tai hänen hoitoympäristöään.</li> </ul> <p>Suojakäsineet ovat toimenpide- ja työvaihekohtaiset.</p>   |   |  |
| <p><b>Aerosolia tuottavissa toimenpiteissä</b> (intubaatio, hengitysteiden imeminen, bronkoskopia, respiraattori- ja CPAP-maski hoito) <b>FFP2 (FFP3) -luokan hengityksensuojain</b></p> <p>Huoneeseen mentäessä ja sieltä poistuttaessa sekä suojainten riisumisen jälkeen <b>desinfioidaan kädet</b> (20–30 s.).</p>   |   |  |
| Eristyksen kesto   | Siivous, pyykki ja jätteet  | Tutkimus- ja hoitotarvikkeet, viihdytysvälineet ja lelut   |
| <p>Eristys voidaan purkaa, kun potilas ollut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kuumeeton 24 tuntia ilman kuumelääkitystä</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>JA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• on kulunut 7 vrk:ta oireiden alusta</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>TAI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• on kulunut 5 vrk:ta virus-lääkkeen aloittamisesta</li> </ul>  | <p>Siivotaan huoneista viimeisenä. Siivousvälineet desinfioidaan käytön jälkeen. Siivousliinat ovat kertakäyttöisiä.</p> <p>Kosketus- ja tasopinnat, saniteettitilat sekä käsienpesu- ja kaatoaltaat puhdistetaan <b>päivittäin kloori 500 ppm tai peroksygeeni</b>.</p> <p><b>Lattiat:</b> Heikosti emäksinen yleispesuaine.</p> <p><b>Eritetahradesinfektio</b> välittömästi tahran ilmaantumisen jälkeen.</p> <p><b>Pyykki:</b> Saumasta liukeneva eristyspyykkipussi, joka laitetaan puhtaaseen pyykkipussiin. Vältetään vuodevaatteiden pölyttämistä.</p> <p><b>Jätteet:</b> Huonekohtainen keräily jäteohjeiden mukaisesti.</p> <p><b>HUOLELLINEN LOPPUSIIVOUS!</b> Loppusiivouksessa pyyhitään myös lattia <b>500 ppm tai peroksygeeni</b>. Väli- ja suihkuverhot laitetaan pesuun ja vaihdetaan uusiin.</p> | <p>Sulkuun/huoneeseen varataan mm. staassi, särmäjäteastia, stetoskooppi, verenpaine- ja kuumemittari.</p> <p>Pyritään valitsemaan huoneeseen viihdytysvälineitä, jotka ovat helposti puhdistettavia.</p> <p>Eristyksen päätyttyä tai tuotaessa välineitä pois huoneesta, ne desinfioidaan huolellisesti desinfiointivassa huuhtelu-laitteessa (esim. DEKO™).</p> <p>Lämpöherkät välineet pyyhitään <b>vähintään 60 % alkoholi, kloori 500 ppm tai peroksygeeni</b>.</p> <p>Eriyistä huomiota kiinnitetään esim. monitorien, näppäimistöjen ja kaukosäätimien pyyhintään.</p> <p>Kertakäyttövälineet laitetaan jätteisiin.</p> |

## KOSKETUSVAROTOIMET JA PISARAVAROTOIMET RSV, ENTEROVIRUS, ADENOVIRUS -infektio tai epäily

Huonesijoitus: yhden hengen huone, jossa oma WC ja suihku, sulkutila.

Potilas ei saa poistua huoneesta kuin tutkimuksia ja hoitoja varten.

Epidemiatilanteissa tarvittaessa kohortointi.

- **Suojatakki tai suojaesiliina**, kliinisessä tutkimuksessa ja lähihoidossa
- **Suojakäsineet**, koskettaessa potilasta ja/tai hänen hoitoympäristöään.  
Suojakäsineet ovat toimenpide- ja työvaihekohtaiset.
- **Kirurginen suu-nenäsuojain**, lähihoidossa
- **Silmäsuojain** tavanomaisten varotoimien mukaan, kun vaara eriteroiskeista

Huoneeseen mentäessä ja sieltä poistuttaessa sekä suojainten riisumisen jälkeen **desinfioidaan kädet** (20–30 s.).

| Taudin aiheuttaja  | Eristyksen kesto | Siivous, pyykit ja jätteet   | Tutkimus- ja hoitotarvikkeet, viihdytysvälineet ja lelut   |
|--|------------------|--|--|
| <b>RSV</b><br><br><b>ENTERO-VIRUS</b><br><br><b>ADENO-VIRUS, pikkulapsilla</b> | Oireiden kesto   | <p>Siivotaan huoneista viimeisenä. Siivousvälineet desinfioidaan käytön jälkeen. Siivousliinat ovat kertakäyttöisiä.</p> <p>Kosketus- ja tasopinnat, saniteetitilat sekä käsienpesu- ja kaatoaltaat puhdistetaan <b>päivittäin kloori 500 ppm tai peroksygeeni</b>.</p> <p><b>Lattiat:</b> Heikosti emäksinen yleispuuaine.</p> <p><b>Eritetahradesinfektio</b> välittömästi tahran ilmaantumisen jälkeen.</p> <p><b>Pyykki:</b> Saumasta liukeneva eristyspyykipussi, joka laitetaan puhtaaseen pyykipussiin. Vältetään vuodevaatteiden pölyttämistä.</p> <p><b>Jätteet:</b> Huonekohtainen keräily jäteohjeiden mukaisesti.</p> <p><b>HUOLELLINEN LOPPUSIIVOUS!</b> Loppusiivouksessa pyyhitään myös lattia <b>500 ppm tai peroksygeeni (2%)</b>. Väli- ja suihkuverhot laitetaan pesuun ja vaihdetaan uusiin.</p> | <p>Sulkuun/huoneeseen varataan mm. staassi, särmäjäteastia, stetoskooppi, verenpaine- ja kuumemittari.</p> <p>Pyritään valitsemaan huoneeseen viihdytysvälineitä, jotka ovat helposti puhdistettavia.</p> <p>Eristyksen päätyttyä tai tuotaessa välineitä pois huoneesta, ne desinfioidaan huolellisesti desinfiiovassa huuhtelu-laitteessa (esim. DEKO™).</p> <p>Lämpöherkät välineet pyyhitään <b>vähintään 60 % alkoholi, kloori 500 ppm tai peroksygeeni</b>.</p> <p>Erityistä huomiota kiinnitetään esim. monitorien, näppäimistöjen ja kaukosäätimien pyyhintään.</p> <p>Kertakäyttövälineet laitetaan jätteisiin.</p> |

## KOSKETUSVAROTOIMET, ILMA- JA PISARAVAROTOIMET

### MERS, SARS, lintuinfluenssa tai pandeeminen influenssa tai epäily

Ks. tautikohtaiset ohjeet hoito-ohjeet.fi sivustolta

Huonesijoitus: **alipaineistettu, yhden hengen huone**, jossa oma WC ja suihku sekä **sulkutila**.  
Potilas ei saa poistua huoneesta kuin tutkimuksia ja hoitoja varten.  
Tarvittaessa kohortointi.

- **FFP3-hengityksensuojain, peitetty venttiili** aina huoneeseen mentäessä.  
Suojain on kertakäyttöinen ja käytinkohtainen.
  - **Suojalasi/kokokasvovisiiri** aina huoneeseen mentäessä
- **Suojatakki** aina huoneeseen mentäessä
- **Hiussuoja** aina huoneeseen mentäessä
- **Suojakäsineet** aina huoneeseen mentäessä
- **Huollettavat suojakengät** aina huoneeseen mentäessä

Huoneeseen mentäessä ja sieltä poistuttaessa sekä suojainten riisumisen jälkeen **desinfioidaan kädet** (20–30 s.).

| Muuta huomioitavaa  | Siivous, pyykki ja jätteet  | Tutkimus- ja hoitotarvikkeet, viihdytysvälineet ja lelut  |
|---|---|---|
| <p>Näytteenoton jälkeen <b>näyteputki</b> pyyhitään sulkutilassa ulkopuolelta vähintään 60% alkoholi ja laitetaan sen jälkeen <b>erilliseen muovipussiin</b>. Pussin päälle merkitään laboratoriolle tiedoksi "MERS/SARS/lintuinfluenssa tai pandeeminen influenssa-epäily".</p> <p>Respiraattori-potilaan uloshengitysilmä ohjataan erilliseen poistoilma-venttiiliin.</p> <p><b>Raskaana olevat</b> työntekijät vapautetaan osallistumasta potilaan hoitoon tai tutkimiseen.</p> <p><b>Kuljetuksen aikana potilas</b> käyttää kirurgista suunenäsuojainta tai venttiilitöntä FFP2 /FFP3-hengityksensuojainta <b>kuljettava henkilökunta</b> FFP3 -hengityksensuojainta, silmäsuojaimia, suojatakia ja -käsineitä.</p> | <p>Siivotaan huoneista viimeisenä. Siivousvälineet desinfioidaan käytön jälkeen. Siivousliinat ovat kertakäyttöisiä.</p> <p><b>Kosketus- ja tasopinnat, saniteetitilat</b> sekä käsienpesu- ja kaatoaltaat <b>päivittäin kloori 500 ppm tai peroksygeeni</b>.</p> <p>Lattiat: <b>Heikosti emäksinen yleispesuaine</b>.</p> <p><b>Eritetahradesinfektio</b> välittömästi tahran ilmaantumisen jälkeen.</p> <p><b>Pyykki:</b> Saumasta liukeneva eristyspyykipussi, joka laitetaan puhtaaseen pyykipussiin. Vältetään vuodevaatteiden pölyttämistä.</p> <p><b>Jätteet:</b> Huonekohtainen keräily ja hävitys jäteohjeiden mukaisesti.</p> <p><b>HUOLELLINEN LOPPUSIIVOUS!</b> Loppusiivouksessa pyyhitään myös lattia <b>500 ppm tai peroksygeeni (2%)</b>. Väli- ja suihkuverhot laitetaan pesuun ja vaihdetaan uusiin</p> | <p>Sulkuun/huoneeseen varataan mm. staassi, särmäjäteastia, stetoskooppi, verenpaine- ja kuumemittari.</p> <p>Pyritään valitsemaan huoneeseen viihdytysvälineitä, jotka ovat helposti puhdistettavia.</p> <p>Eristyksen päätyttyä tai tuotaessa välineitä pois huoneesta, ne desinfioidaan huolellisesti desinfiiovassa huuhtelulaitteessa (esim. DEKO™).</p> <p>Lämpöherkät välineet pyyhitään <b>vähintään 60 % alkoholi, kloori 500 ppm tai peroksygeeni</b>.</p> <p>Erityistä huomiota kiinnitetään esim. monitorien, näppäimistöjen ja kaukosäätimien pyyhintään.</p> <p>Kertakäyttövälineet laitetaan jätteisiin.</p> |

