

Rintarauhasen stereotaktinen imubiopsia

Potilasohje

Tutkimuksella selvitetään rintarauhasesta löydetyt muutokset laatuun.

Miten valmistaudut tutkimukseen?

2-3 päivää ennen näytteenottoa mahdollinen verenhennuslääke jätetään tauolle, mikäli se perussairaus (esim. läppäproteesi) huomioiden on mahdollista. Näissä tapauksissa asiasta on neuvoteltava hoitavan lääkärin kanssa. Tutkimukseen ei ole muita esivalmisteluja.

Miten tutkimus tehdään?

Näytteenottokohta puudutetaan aina ennen biopsiaa. Pistokohtaan tehdään pieni ihoahaava.

Näytteet otetaan mammografialaitteella rintarauhasen ollessa napakassa puristuksessa.

Tutkimukseen tulee varata aikaa noin 1,5 tuntia.

Mitä tutkimuksen jälkeen?

Näytteenoton jälkeen pistokohtaa painetaan kylmäpussilla vähintään 10 minuuttia verenvuodon välttämiseksi. Tutkimuksen jälkeen rintarauhanen saattaa tuntua aralta ja siihen kehittyä mustelma.

Pistokohta tulee pitää kuivana 1 vuorokauden ajan. Näytevastauksen valmistuminen kestää noin 1 viikon. Tuloksista kuulet lähettävältä lääkäriltä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • www.vsshp.fi • Vaihde 02 313 0000

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.