

# VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAANHOITOPIIRI

## SAPPI- JA HAIMATEIDEN KUVAUS ELI ERCP

ERCP on tähytys- ja kuvantamistutkimus, jonka avulla voidaan todeta sappiteiden ja haiman sairauksia. Tutkimus tehdään taipuisalla tähystimellä suun kautta mahalaukkuun ja sieltä ohutsuolen alkuosaan. ERCP:n yhteydessä voidaan tehdä erilaisia toimenpiteitä röntgenlöpivalaisua ja varjoainetta käyttäen.

### Ennen tutkimusta

- Ole syömättä ja juomatta edellisestä illasta klo 24 lähtien.
- Ota lääkkeet normaalisti aamulla klo 6.00 pienen vesimäärän kanssa.
- Ilmoita henkilökunnalle mikäli sinulla on varjoaineyleherkkyys tai allergioita.
- Röntgenlöpivalaisun vuoksi mahdollinen raskaus on selvitettävä ennen tutkimusta.
- Sinulle laitetaan käsivarren suoneen kanyyli.

### Tutkimuksessa

- Olet kylkiasennossa tutkimuspöydällä.
- Saat suihkutettavan puudutusaineen nieluun.
- Saat kanyylin kautta rauhoittavaa- ja kipulääkettä.
- Hengitystiet pysyvät avoimina koko tutkimuksen ajan.
- Tutkimus kestää noin 20–60 minuuttia.

### Tutkimuksen jälkeen

- Lääkityksen vuoksi voit olla unelias tai tuntea nielun yhä puutuneeksi.
- Saat syödä ja juoda noin 2 tunnin kuluttua mikäli voitisi niin sallii.
- Olet sairaalassa seurannassa muutamia tunteja.
- Kova mahakipu ja lämpöily voivat olla merkkejä komplikaatioista. Ne ovat yleensä helposti hoidettavissa ilman lisätoimenpiteitä, mutta edellyttävät muutaman päivän sairaalassa.

### Kotiutuminen ja jälkitarkastus

- Kotiutuminen tapahtuu tutkimuspäivän aikana tai seuraavana päivänä voinnin mukaan.
- Mikäli kotiudut sama päivänä, tulee sinulla olla hakija klo 15 mennessä.
- Mahdollinen jälkitarkastusaika annetaan kotiutumisen yhteydessä.

### Ota yhteyttä hoitavaan yksikköön tai alueesi päivystykseen jos ilmaantuu

- Voimakasta vatsakipua, joka ei helpotu kipulääkkeillä
- Verioksentelua
- Mustaa ulostetta
- Kuumetta yli 38 astetta

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • [www.vsshp.fi](http://www.vsshp.fi) • Vaihde 02 313 0000

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.