

Spinaalidreeniohje potilaalle

Tämän ohjeen tavoitteena on antaa potilaalle ja hänen omaisilleen tietoa spinaalidreenistä eli selkäydinkanavan laskuputkesta.

Spinaalidreeni on suljettu letkusto, jonka toisessa päässä on keräyspussi aivoselkäydinnestettä varten. Spinaalidreeni voidaan laittaa jos pään tai selkärangan alueen leikkaushaavalla esiintyy aivoselkäydinneste-pullotusta tai vuotoa. Tarkoituksena on laskea painetta haava-alueelta johtamalla liiallinen aivoselkäydinneste spinaalidreenin kautta keräyspussiin.

Spinaalidreeni voidaan laittaa myös tutkittaessa aivo-selkäydinnestekiertoa ja mahdollista tarvetta shunttiletkustolle eli aivo-selkäydinnesteläppälaitteelle.

Spinaalidreenin laittaminen

Lääkäri määrää spinaalidreenin laittamisen. Spinaalidreeni laitetaan heräämössä. Toimenpiteen tekee nukutuslääkäri, joka lannepiston avulla vie laskuputken lannenikamien väliin selkäydinkanavaan. Heräämössäoloaika on yhteensä noin 30 minuuttia, jonka jälkeen pääset takaisin vuodeosastolle.

Spinaalidreenihoidon aikana

Spinaalidreenin kanssa voi liikkua. Letkustossa on hana, joka tulee sulkea ylhäällä ollessa. Makuulla ollessa hana tulee avata. Hoitajat ohjaavat spinaalidreenin käytössä.

Spinaalidreenipussia säilytetään vuoteessa ollessasi makuulla. Letkusto on kiinnitetty selkään yleensä yhden ompeleen ja muovikalvon avulla.

Hoitajat tarkkailevat spinaalidreenihoidon aikana vointiasi ja seuraavat myös keräyspussiin tullutta erityismäärää. Spinaalidreeniä pidetään tapauskohtaisesti muutamasta päivästä jopa viikkoon. Spinaalidreenin ajan olet sairaalassa.

Kerro välittömästi hoitajallesi jos sinulla ilmenee päänsärkyä, pahoinvointia, valonarkuutta silmissä tai niskajäykkyyttä. Nämä voivat olla spinaalidreenin aiheuttamia tulehdusoireita.

Spinaalidreenihoidon jälkeen

Spinaalidreeniä ei saa venyttää tai itse poistaa selästä. Spinaalidreenihoidon loppuessa hoitaja poistaa letkuston. Lääkäri kertoo sinulle mahdollisista jatkotoimenpiteistä spinaalidreenin poiston jälkeen.

Ongelmatilanteissa

Ota yhteys ensisijaisesti oman alueesi päivystykseen:

- jos nousee kuume
- jos selän pistokohta vuotaa
- jos päänsärky tai pahoinvointi lisääntyy
- jos tajunta alenee tai ilmenee sekavuutta
- jos toimintosi hidastuvat tai raajavoimat oleellisesti heikkenevät
- jos tulee muita ongelmia joiden epäilet liittyvän saamaasi hoitoon

Kotiutumiseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä sairaanhoitajan ohjauspuhelimeen 02 3137172 arkisin kello 14-15.

Todistusasioissa voit soittaa suoraan osastonsihteerille 02 313 2249 arkisin kello 8-15.

Toivotamme sinulle hyvää vointia!