



VRE ja ResGNS -seulonnan näytteenottokohdat

Seulonnanäytteet ovat tarpeen esimerkiksi ulkomaisen sairaalahoidon jälkeen MRSA -näytteiden lisäksi. Seulonnaviljelynäytteitä ei suositella otettavaksi antibioottihoitojen aikana, koska antibiootit voivat aiheuttaa väärän negatiivisen seulontatuloksen. Katso lisätietoja hoito-ohjeet.fi: <https://hoito-ohjeet.fi/fi/hoito-ja-tutkimukset-haku?Termi=6f55965a-232f-4ad7-a49c-61ecbb089586&Sairaanhoitopiiri=VSSHPI>

VRE -viljely (VREVix2)

Vankomysiinille resistenttien enterokokkien selvittämiseksi tehtävä näytteenotto.

1) Uloste tai peräsuoli



Kuvassa: eSwap näytteenotto- ja kuljetusputki sekä näytepakettiin kuuluva nukkatikku, joka katkaistaan näytteenoton jälkeen putkeen kuvassa näkyvästä (punaisesta) katkaisukohdasta.

VREVix2 Yksi näytepyyntö sisältää pyynnön **kahdelle peräkkäiselle päivälle**.

Näytteiden otossa pitää olla väliä vähintään vuorokausi (24 h), voi olla enemmänkin.

Näytteenottokohta: uloste tai peräsuoli (rectum).

Näyteputket: eSwab (punainen korkki)

-eSwab-näytteenotto- ja kuljetusputki sisältää 1ml nestemäistä liuosta. Sulje korkki huolellisesti kuljetusta varten!

-Näyte otetaan näytepakettiin kuuluvalla nukkatikulla, joka katkaistaan katkaisukohdastaan (punainen merkki tikussa) eSwap -putkeen.


-Ulostenäytteessä: kasta näytetikku ulosteeseen.

-Näytetikku (eSwap) ei kostuteta ennen näytteenottoa.

VRE-viljely (1788)

Suorassa sairaalasiirrossa ulkomailta potilaalta otetaan lisäksi erikseen näytteet:

- ihorikko
- haava(t)
- dreenin juuri
- muun ihoa läpäisevän vierasesineen juuri (ei perifeerinen) kanyyli
- virtsakatetrin virtsanäyte (ota virtsaa puhtaaseen näytepurkkiin, kasta sen jälkeen eSwap -näyteputken valkovartinen näytteenottotikku virtsanäytepurkissa. Laita sitten tämä valkoinen näytetikku eSwap -putkeen ja sulje korkki huolellisesti.)




Jokaiselle näytekohdalle tehdään oma VRE- viljelypyyntö (VREVi, 1788)

Jokaisesta näytekohdasta otetaan näyte omaan putkeen, jossa on lisäksi oltava tieto mistä kohdasta näyte on otettu. Näytteen ottokohta on ilmoitettava pyynnössä ja tutkimus on tilattava niin monta kertaa kuin ottokohtia on. Jokaiseen näyteputkeen laitetaan potilastiedot ja tutkimustiedot sisältävä tarra sekä näytteenottokohdan sisältävä tarra. Saman potilaan näyteputket lähetetään yhteen liitettynä laboratorioon.

ResGNS- viljely (ResGNSVix2)

Resistenttien gram-negatiivisten sauvabakteerien selvittämiseksi tehtävä näytteenotto.

1) Uloste tai peräsuoli

Kuvassa: eSwab näytteenotto- ja kuljetusputki sekä näytepakettiin kuuluva nukkatikku, joka katkaistaan näytteenoton jälkeen putkeen kuvassa näkyvästä (punaisesta) katkaisukohdasta.

ResGNSVix2 Yksi näytepyyntö sisältää **pyynnön kahdelle peräkkäiselle päivälle.**

Näytteenotto-kohta: uloste tai peräsuoli (rectum).

Näyteputket: eSwab (punainen korkki)

-eSwab-näytteenotto- ja kuljetusputki sisältää 1ml nestemäistä liuosta. Sulje korkki huolellisesti kuljetusta varten!

- Näyte otetaan näytepakettiin kuuluvalla nukkatikulla, joka katkaistaan katkaisukohdastaan eSwab -putkeen.

- Ulostenäytteessä: kasta näytetikku ulosteeseen.

-Näytetikku (eSwab) ei kostuteta ennen näytteenottoa.


ResGNSVi (11815)

2) Jos potilaalla on muita infektiokohtia, otetaan erikseen näytteet:

- ihorikko
- haava(t)
- dreenin juuri
- muun ihoa läpäisevän vierasesineen juuri (ei perifeerinen kanyyli)

-virtsakatetrista virtsanäyte (ota virtsaa puhtaaseen näytepurkkiin, kasta sen jälkeen eSwab -näyteputken valkovartinen näytteenottotikku virtsanäytepurkissa.

Laita sitten tämä valkoinen näytetikku eSwab -putkeen ja sulje korkki huolellisesti.)



Jokaiselle näytekohdalle tehdään oma ResGNS- viljelypyyntö (11815).

Jokaisesta näytekohdasta otetaan näyte omaan putkeen, jossa on lisäksi oltava tieto mistä kohdasta näyte on otettu. Näytteen ottokohta on ilmoitettava pyynnössä ja tutkimus on tilattava niin monta kertaa kuin ottokohtia on. Jokaiseen näyteputkeen laitetaan potilastiedot ja tutkimustiedot sisältävä tarra sekä näytteenottokohdan sisältävä tarra.

Epidemiaselvitysten yhteydessä tehtävissä näytteenotoissa ilmoitetaan laboratoriopyynnön lisätietokohtaan tieto etsittävästä mikrobista (esim. Klebsiella, CPE).

Saman potilaan näyteputket lähetetään yhteen liitettynä laboratorioon.