

# EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

## CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXINGEN I AVFÖRINGEN, PÅVISNING AV NUKLEINSYRA (F-CIdTNhO, 6141)

Testet används för att påvisa förekomsten av genen för toxinet hos diarréframkallande bakterie.

### Förnödenheter

1. Behållare av plast eller papp
2. Copan eSwab 490CE.A –provtagningssticka och rör (ljusröd kork, se figur 1)
3. Plastpåse och namndekal



Figur 1. Copan eSwab

### Provtagning

1. Låt avföring komma i plast- eller pappbehållaren eller på toalettpapper.
2. Rulla den bomullsförsedda ändan av provtagningsstickan i avföringen, särskilt i de delar av provet som innehåller slem.
  - Undvik att ta med alltför mycket av avföringen i provet!
  - Om avföringen är flytande, håll provtagningsstickans bomullsförsedda ända en stund i avföringen.
3. Genast efter att du tagit provet, överför provtagningsstickan i transportröret som har ljusröd kork och vätska på botten.
  - Obs! Häll inte bort vätskan ur provröret.
4. Bryt av provstickan vid brytstället och tillslut korken.
5. **Skriv ditt namn, personnummer, provtagningsdatum och provtagningsklockslag på namndekalen som följer med bland förnödenheterna från laboratoriet.**
6. **Fäst namndekalen vid transportröret.**
7. Lägg transportröret i plastpåsen som följer med bland förnödenheterna från laboratoriet.
8. Förvara Copan eSwab-provröret i rumstemperatur.

**Returnera Copan eSwab-transportröret till laboratoriet senast dagen efter provtagningen!**

Om du har frågor gällande provtagning, ta gärna kontakt med avdelningen eller polikliniken som ordinerat undersökningen.

Du kan fråga efter svaret hos enheten där du vårdas.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt • [www.vsshp.fi/sv](http://www.vsshp.fi/sv) • Växel 02 313 0000

Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.