

Hudpricktest

Hudpricktestet är en grundundersökning vid omedelbara reaktioner, så som misstänkt allergisk snuva, andnöd eller utslag. Med hjälp av testet utreds sensibilisering av bland annat pollen, djurmjäll och födoämnen.

Hur görs undersökningen

Testet görs på under- eller överarmens innersida eller på ryggen. Hudpricktestet kan göras på personer i alla åldrar. Testämnen sätts i huvudsak som små droppar på huden. Vid varje enskild droppe trycker man lätt med en vass lansett. Testreaktionen lyfter en utbuktning på huden, vilken man mäter efter 15 minuter. Läkaren utvärderar undersökningsresultatets betydelse och diskuterar med dig om dem i samband med testbesöket.

Hur förbereder jag mig inför undersökningen

- Håll innan testet en paus på 5 dygn från allergimediciner samt mediciner mot klåda.
- Håll innan testet en paus på 5 dygn från hostmediciner och antidepressiva läkemedel.
- Inhalerbara lungmediciner kan du ta normalt.
- Använd inte på två dygn innan testet kortisonsalvor eller Protopic- eller Elidel-salvor på under- samt överarmarna. Undvik dessa salvor även på ryggen. Andra hudområden kan du vid behov vårda normalt.
- Avsluta användningen av bassalva på testområdena ett dygn innan testet.
- Avsluta soltagning och ljusbehandling en vecka innan testet.
- Om pausen med medicineringen orsakar problem, kontakta din vårdande läkare.
- Hudpricktestet görs vanligtvis inte under graviditetstiden.

Efter hudpricktestet

Hudpricktestet orsakar nyprningar och tillfällig klåda på huden, men annars kan man efter testet vårda huden normalt.