

EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

INTRAVESIKAL EMDA MITOMYCIN-C-BEHANDLING

Syftet med behandlingen är att förebygga återfall och framskridning av urinblåsecancer.

Förberedelser inför behandlingen

- För ett urinprov till hälsovårdscentralen tre dagar före varje behandling. Ifall det finns en infektion i urinen blir du kontaktad från sjukhuset och vid behov vårdas med antibiotika.
- Du får salttabletter från sjukhuset som tas enligt följande:
 - föregående kväll tas 1,5 gram salttabletter (antingen 3 x 500 mg eller 2 x 750 mg)
 - på dagen för behandlingen tas 1,5 g salttabletter 30 minuter före behandlingen.
- Drick inget 8 timmar före behandlingen.
- Du får äta normalt på morgonen.
- Du får ta dina morgonmediciner som normalt, ta eventuella vätskedrivande mediciner först efter behandlingen.

Genomförandet av behandlingen

- Urinblåsan töms före behandlingen med hjälp av en urinkateter, samma kateter används för att sätta in medicinen i blåsan.
- Man leder lågspännig elektrisk ström (25 mA) till urinblåsan med hjälp av katetern och EMDA-apparatur.
- Åtgärden räcker 30-40 minuter under vilken du kan känna ryckande eller kittlande känsla i magens nedre del. Behandlingen orsakar inte smärta.
- Efter behandlingen tas medicinen bort med hjälp av katetern och därefter avlägsnas katetern.
- Det är bra att reservera en timme för behandlingen.

Efter behandlingen

- Drick rikligt efter behandlingen (från 2 timmar efter behandlingen) för att skölja urinvägarna.
- Den möjliga blodiga urinen försvinner oftast genom att dricka rikligt.
- Behandlingen kan orsaka:
 - Klåda, värmekänsla och nypande känsla på huden
 - Rodnad på huden av magens nedre del som räcker vanligtvis max 24 timmar.
 - Ökat urineringsbehov eller blodig urin som försvinner av sig själv.
 - Sveda i urinröret och hudirritation runt könsorganen.
- Du kan ta värkmedicin vid behov.
- För att det inte skall bli kvar medicin på huden är det speciellt viktigt att tvätta händerna och könsorganen varje gång du urinerat 2 dygn efter behandlingen. Efter toalettbesök skall WC-byttan sköljas två gånger med locket stängt.
- För att undvika stänk rekommenderas att även män sitter ner och urinerar.
- Använd kondom för att skydda din partner eller avstå från att ha samlag under en veckas tid.

Kontakta den vårdande enheten eller jouren ifall;

- Du får över 38°C feber
- Urinen är kraftigt blodig
- Ditt allmäntillstånd försvagas
- Berätta om behandlingen ifall du misstänker att symptomen beror på EMDA-MMC vården.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt • www.vsshj.fi/sv • Växel 02 313 0000

Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.