

## Korrigerig av trikuspidalklaffen med klipps, TriClip®

Du har fått diagnosen trikuspidalinsufficiens (trikuspidalklaffsvikt). Detta läckage kan repareras med TriClip®-anordning till en vald patientgrupp.

### Förberedelser före åtgärden

- Du får separata instruktioner om eventuella läkemedels uppehåll och undersökningar som görs före åtgärden.
- Du anländer till sjukhuset antingen kvällen innan åtgärden eller på åtgärds morgonen.
- Kontrollera att ljumskarnas hud inte har eksem eller rodnader.
- Ät eller drick ingenting 6 timmar före åtgärden.

### Åtgärdsförloppet

Åtgärden görs i anestesi/narkos och räcker i cirka 3 timmar.

Under åtgärden för man in TriClip®-anordningen till hjärtat via venen i ljumskan. Till hjälp används ultraljudsundersökning som görs via matstrupen, röntgenstrålning och kontrastmedel som innehåller jod.

Komplikationer är sällsynta.

### Efter åtgärden

Du kommer att vårdas på hjärtövervakningen eller uppvakningsavdelningen enligt läkarens anvisningar. Från hjärtövervakningen flyttas du till hjärtavdelningen. Du är i sängvila i cirka 6 timmar.

Efter åtgärden kommer du att ha besvär i halsen på grund av anestesi och ultraljudsundersökningen som gjorts via matstrupen. Det kan uppstå blåmärke i ljumskan. Några andra känningar borde inte uppkomma.

Dagen efter åtgärden görs en ultraljudsundersökning av hjärtat. Utskrivningen och eftervård sker individuellt enligt läkarens anvisningar. I allmänhet blir man utskriven 2 dagar efter åtgärden.

TriClip®-anordningen är inte ett förhinder för magnetundersökning (MRI). Ifall du hamnar att besöka tandläkaren inom 3 månader från åtgärden, till exempel vid tandborttagning, bör antibiotikabehandling påbörjas.

## **Kontakta din vårdande enhet**

- Om du har infektions symptom eller feber.
- Om du misstänker att du är gravid. Under åtgärden används röntgenstrålar.

[Sydänsairaudet.fi](https://www.sydansairaudet.fi) bjuder information om vuxnas hjärtsjukdomar, deras vård och deras förebyggande.