

Metakolinexpositionstest

Med hjälp av undersökningen utreder man kontraktionskänslighet av luftrören, dvs. känsligheten att reagera på stimulus.

Förberedelser inför undersökningen:

- 1 dygn inför undersökningen får man inte dricka alkohol
- 4 timmar inför undersökningen får man inte dricka kaffe, te, coladrycker eller andra stimulerande drycker, inte heller får man äta choklad
- 2 timmar inför undersökningen får man inte röka eller använda andra nikotinprodukter
- 2 timmar inför undersökningen skall man undvika kraftig fysisk ansträngning
- du kan äta lätt inför undersökningen
- användning av parfym på polikliniken är förbjuden

Expositionstest med metakolin tar cirka 1 ½ timmar.

Undersökningen görs när patienten har så få symptom som möjligt

- akut luftvägsinfektion eller andningssvårigheter hindrar genomföringen av undersökningen
- det skall ha tagit 4 veckor av tillfrisknandet men med läkarens beslut kan undersökningen göras också tidigare

Undersökningen genomförs inte för gravida patienter.

I fall du använder följande mediciner, skall du pausera användning av dem på följande sätt:

12 timmar inför testet: Airomir, Bricanyl, Buventol, Salbutamol, Ventilastin, Ventoline, Rinexin, Lomudal, Efedrin

1 dygn inför testet: Atrovent, Ipraxa, Atrodual, Atrovent comp, Ipramol, Tilade

2 dygn inför testet: Cycloterol, Fomeda, Foradil, Formaxa, Formoterol, Oxis, Serevent, Duaklir, Eklira

3 dygn inför testet: Accolate, Astecon, Montelukast, Singulair, Ephyplong,

Nuelin depot, Retafyllin, Theofol, Theofol comp, Theofyllini, Aminocont, Incruse, Anoro samt alla hostmediciner

4 dygn inför testet: Spiriva

5 dygn inför testet: antihistaminer och mediciner som innehåller antihistamin (tablettmediciner för allergi, pauseras inför expositionstest av luftrören): Aerinaze, Aerius, Alzyl,

Atarax, Atosil, Benadryl, Cetimax, Cetirizin, Cirrus, Clarityn, Dasselta, Desloratadine, Difenhydramine, Duact, Gardex, Heinix, Histadin, Histec, Kestine, Kestox, Lastin, Levazyr, Levocetirizine, Livostin, Loratadin, Marzine, Mirtazapin, Mirtachem, Nefoxef, Nosedan, Peritol, Postafen, Remeron, Revitelle, Rinomar, Tavegyl, Telfast, Tuulix, Xyzal, Zyrtec

5 dygn inför testet: Daxas

7 dygn inför testet: Onbrez, Striverdi

12 dygn inför testet: Seebri, Ultibro

4 veckor inför testet: Aerobec, Alvesco, Asmanex, Beclomet, Budesonid, Flixotide, Flutide, Novopulmon, Pulmicort

Enligt läkarens anvisning följande:

2 dygn eller 4 veckor: Seretide, Bufomix, Symbicort, Innovair, Flutiform

3 dygn eller 4 veckor: Relvar

Ta kontakt till lungmedicinska polikliniken på vardagar kl. 07.30-15.00 om:

- du har frågor gällande dina mediciner
- du använder tablettkortison

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt • www.vsshp.fi/sv • Växel 02 313 0000

Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.