

## Abatasepti, ORENCIA® – reumasairauksien hoidossa

---

### Käyttöaiheet

Abataseptia käytetään mm. nivelreuman ja lastenreuman hoidossa, kun perinteisillä reumalääkkeillä ei ole saavutettu riittävää hoitovastetta tai niitä ei voida käyttää.

### Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Abatasepti kuuluu biologisten lääkeaineiden ryhmään. Ihmisen immuunijärjestelmän T-soluilla on keskeinen merkitys nivelreuman aiheuttamassa tulehduksessa ja nivelvaurion synnyssä. Abatasepti kiinnittyy T-solun pintaan ja hillitsee tulehdusta estämällä solujen välistä viestintää.

### Annostus ja antotapa

Abatasepti voidaan annostella joko ihonalaisena pistoksena tai laskimonsisäisenä infuusiona. Abatasepti annetaan yleensä ruiskeena ihon alle 125 mg kerran viikossa käyttäen joko esitäytettyä kynää (ClickJet) tai ruiskua. Laskimoon annettaessa lääkeinfuusio kestää 30 minuuttia ja potilasta seurataan tunti poliklinikalla. Ensimmäisen annoksen jälkeen seuraavat abatasepti-infuusiot annetaan 2 ja 4 viikon kuluttua ensimmäisestä ja jatkossa 4 viikon välein.

### Haittavaikutukset

Lääkkeen antamisen yhteydessä voi esiintyä pistopaikkareaktioita tai allergisia reaktioita kuten kutinaa, ihottumaa tai yskää. Infuusioreaktioita esiintyy harvoin. Päänsärky, huimaus ja verenpaineen nousu ovat mahdollisia. Krooninen obstrukttiivinen keuhkosairaus (COPD) voi joskus pahentua. Abatasepti saattaa lisätä alttiutta infektioihin. Lievää valkosolujen määrän laskua saattaa ilmetä, mutta vakava valkosolukato on harvinaista. Lääke tulee tauottaa kuumeisten tai antibioottihoitoa vaativien infektioiden ajaksi.

### Raskaus ja imetys

Abataseptia ei suositella käytettäväksi raskauden ja imetyksen aikana. Lääke suositellaan tauotettavaksi kolme kuukautta ennen suunniteltua raskautta.

### Hoidon seuranta

Turvakokeet tutkitaan kuukauden kuluttua aloituksesta ja jatkossa harkinnan mukaan 3-6 kuukauden välein. Tulokset tarkistetaan terveyskeskuksessa. Turvakokeet ovat seuraavat: PVK, B-NEUT ja ALAT.

KREA, U-Kemseu, CRP ja La tutkitaan sairauden hoitoarvion yhteydessä ennen lääkärikäyntiä 6-12 kk välein.

## **Muuta huomioitavaa**

Abatasepti tauotetaan annostelutavasta riippuen vähintään yksi viikko ennen ja kaksi viikkoa jälkeen leikkauksen. Leikkaus ajoitetaan ajankohtaan, jolloin seuraava lääkeannos otettaisiin. Yksittäisen potilaan lääketauon pituuteen vaikuttaa myös leikkauksen luonne ja kiireellisyys, potilaan yleinen infektioriski ja perussairauden uusiutumiskirski. Lääkitys voidaan aloittaa uudelleen, kun haava on hyvin parantunut.

Elävää, heikennettyä taudinaiheuttajaa sisältäviä rokotteita ei pidä antaa hoidon aikana. Ennen lääkehoidon aloitusta hampaat tulee olla hoidetut ja rokotukset ajan tasalla.

**Linkki** [Reumalääkkeiden ohjeet | Reumatalo.fi | Terveyskylä.fi](#)

## **Yhteystiedot**

Reumasairauksien poliklinikka  
Soittoaika klo 09-12  
p.02 627 8612