

Etanersepti, Enbrel®, Erelzi®, Benepali®, Nepexto®,– reumasairauksien hoidossa

Käyttöaiheet

Etanerseptia käytetään mm. nivelreuman, selkärankareuman, nivelpsoriaasin ja lastenreuman hoidossa, kun perinteisillä reumalääkkeillä ei ole saavutettu riittävää hoitovastetta tai niitä ei voida käyttää.

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Etanersepti kuuluu biologisten lääkeaineiden ryhmään. Sytokiinit, solujen väliset viestinviejäaineet, ylläpitävät tulehdusreaktiota nivelreumassa ja muissa tulehduksellisissa nivelsairauksissa. Tulehduksen kannalta keskeisimpiä sytokiineja on mm kasvainnekroositekijä (Tumor Necrosis Factor, TNF). Etanersepti on kasvainnekroositekijän TNF reseptori-analogi ja se neutraloi TNF:n biologista aktiivisuutta. Lääke rauhoittaa niveltulehdusta ja estää sen etenemistä sekä nivelten vaurioitumista

Annostus ja antotapa

Etanersepti annostellaan ihonalaisena pistoksena 50 mg viikon välein käyttämällä joko esitäytettyä ruiskua tai kynää. Lääke on saatavana myös 25 mg esitäytettynä ruiskuna ja 25 mg tai 50 mg kuiva-ainetta sisältävinä neljän injektiopullon pakkauksina.

Haittavaikutukset

Yleisin haittavaikutus on iholla lääkkeen pistoskohdassa ilmenevä paikallinen ärsytysoire kuten punoitus, kipu tai kutina. Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat mm. hengitysinfektiot, ihottuma, kutina, päänsärky, sydämen vajaatoiminnan paheneminen ja verenkuvan muutokset. Etanersepti saattaa lisätä alttiutta infektioihin. Allergiset reaktiot ja vakavat infektiot ovat kuitenkin melko harvinaisia. Lääke tulee tauottaa kuumeisten tai antibioottihoitoa vaativien infektioiden ajaksi. Tuberkuloosiin sairastumisen riski on selvitettävä jo ennen hoidon aloitusta.

Raskaus ja imetys

Etanersepti lopetetaan, kun raskaus todetaan. Sen käyttöä voidaan harkita raskausviikolle 32 saakka. Lääkettä voidaan käyttää imetyksen aikana ensimmäisen imetysviikon jälkeen.

Hoidon seuranta

Turvakokeet tutkitaan **kuukauden kuluttua aloituksesta ja jatkossa 3-6 kuukauden välein**. Tulokset tarkistetaan terveyskeskuksessa. Turvakokeet ovat seuraavat: **PVK, B-NEUT ja ALAT. KREA, U-Kemseu, CRP** ja **La** tutkitaan sairauden hoitoarvion yhteydessä ennen lääkärikäyntiä 6-12 kk välein.

Muuta huomioitavaa

Etanersepti tauotetaan vähintään yksi viikko ennen ja jälkeen leikkauksen. Leikkaus ajoitetaan ajankohtaan, jolloin seuraava lääkeannos otettaisiin. Yksittäisen potilaan lääketauon pituuteen vaikuttaa myös leikkauksen luonne ja kiireellisyys, potilaan yleinen infektioriski ja perussairauden uusiutumisriski. Lääkitys voidaan aloittaa uudelleen, kun haava on hyvin parantunut.

Elävää, heikennettyä taudinaiheuttajaa sisältäviä rokotteita ei pidä antaa hoidon aikana. Ennen lääkehoidon aloitusta hampaat tulee olla hoidetut ja rokotukset ajan tasalla.

Linkki [Reumalääkkeiden ohjeet | Reumatalo.fi | Terveyskylä.fi](#)

Yhteystiedot

Reumasairauksien poliklinikka
Soittoaika klo 09-12
p.02 627 8612