

Klorambusiili, LEUKERAN® – reumasairauksien hoidossa

Vaikutustapa/ käyttöaiheet

Klorambusiili on typpisinappikaasun johdos. Sinappityppi on tietynlaisten solunsalpaajien kantälääke. Lääkettä käytetään nivelreuman vaikeissa muodoissa hidastamaan sairauden etenemistä. Vaikutus ilmaantuu 2-4 kuukauden kuluessa.

Annostus ja antotapa

Lääke on 2 mg:n tabletteina. Klorambusiilin päiväannos on 0.1-0.2 mg/kg kahteen annokseen jaettuna. Lääkäri määrää annoksen yksilöllisesti. Tabletit niellään kokonaisena runsaan nesteen kera. Niitä ei saa puolittaa eikä murskata.

Säilytys

Tabletit säilytetään jääkaapissa.

Haittavaikutukset

Etenkin suuret annokset voivat haitata luuytimen toimintaa, jolloin verisolujen muodostuminen vähenee. Mustelmien ilmaantuminen ilman selvää syytä voi olla seurausta verihiutaleiden mataluudesta. Myös vatsan- ja suolistoalueen haittavaikutuksia voi esiintyä. Klorambusiili voi lisätä alttiutta infektioille. Lääkettä ei anneta vakavan infektion aikana.

Raskaus ja imetys

Raskauden ja imetyksen aikana lääkettä ei saa käyttää. Huolehdi lääkityksen aikana luotettavasta ehkäisystä! Lääkitys on lopetettava viimeistään 3 kuukautta ennen suunniteltua raskautta. Suositus koskee myös miehiä.

Seuranta

Lääkkeen aloituksesta turvakokeet 2-3, 6 ja 12 viikon välein, sitten 3-6 kk välein. Tulokset tarkistetaan terveyskeskuksessa. Turvakokeet ovat seuraavat PVK, B-NEUT, ja ALAT KREA, U-Kemseu, CRP ja LA tutkitaan hoitoarvion yhteydessä ennen lääkärikäyntiä 6-12 kk välein.

Muuta huomioitavaa

Lääke kannattaa tauottaa viikko ennen leikkausta ja sitä voi jatkaa 2 viikon kuluttua, kun haava on parantunut. Eläviä, heikennettyjä mikrobeja sisältäviä rokotuksia ei suositella otettavaksi lääkehoidon aikana.

Linkki [Reumalääkkeiden ohjeet](#) | [Reumatalo.fi](#) | [Terveyskylä.fi](#)

Yhteystiedot

Reumasairauksien poliklinikka

Soittoaika klo 09-12

p.02 627 8612