

# Lapsen mahan tähyystys tai paksusuolen tähyystys nukutuksessa

---

## Toimenpiteen jälkeen

Seuraamme lapsen vointia heräämössä, josta hänet voidaan kotiuttaa yleensä 3-4 tunnin seurannan jälkeen. Ennen kotiutusta lääkäri keskustelee kanssanne löydöksistä ja jatkosuunnitelmista. Koepalavastaukset lähetetään kotiin myöhemmin.

Juotavaa lapselle voidaan antaa varovasti noin tunnin kuluttua nukutuksen päättymisestä. Ellei juominen aiheuta lapselle pahoinvointia, annetaan hänelle heräämössä kevyttä viileää syötävää, esim. jäätelöä tai jogurttia. Kotona lapsi voi syödä tavallista ruokaa.

Toimenpidepäivänä lapsen on syytä pysytellä sisällä, eikä häntä saa jättää yksin ilman aikuisen valvontaa. Hän saa olla leikeissään oman voinnin mukaan. Kouluun tai päiväkotiin lapsi voi mennä seuraavana päivänä.

## Kivunhoito

Kurkkukipuun voi lapselle antaa parasetamolia ( esimerkiksi PamolF®). Muutamaan päivään ei suositella tulehduskipulääkkeitä vatsaärsytyksen vuoksi.

## Ota yhteyttä, jos lapsella on

- kuumetta yli 38,5°
- voimakasta vatsakipua

## Yhteystiedot

Päiväkirurgian yksikkö  
Maanantaista perjantaihin kello 8.00-15.00  
Puhelin 02 627 3840

Lastenosasto  
Puhelin 02 627 6512

