

## Sarilumabi, KEVZARA® – reumasairauksien hoidossa

---

### Käyttöaiheet

Sarilumabia käytetään mm. nivelreuman hoidossa, kun perinteisillä reumalääkkeillä ei ole saavutettu riittävää hoitovastetta tai niitä ei voida käyttää.

### Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Sarilumabi kuuluu biologisten lääkeaineiden ryhmään. Sytokiinit, solujen väliset viestinviejäaineet, ylläpitävät tulehdusreaktiota nivelreumassa ja muissa tulehduksellisissa nivelsairauksissa. Tulehduksen kannalta yksi keskeisimpiä sytokiineja on interleukiini-6 (IL-6). Sarilumabi on IL-6 reseptorin vasta-aine ja se neutraloi IL-6:n biologista aktiivisuutta. Lääke rauhoittaa niveltulehdusta ja estää sen etenemistä sekä nivelten vaurioitumista.

### Annostus ja antotapa

Sarilumabi annetaan ihonalaisena pistoksena esitäytettyä kynää käyttäen. Annos on yleensä 200 mg joka toinen viikko, joskus 150 mg joka toinen viikko.

### Haittavaikutukset

Sarilumabi voi lisätä alttiutta infektioille. Lääke tulee tauottaa kuumeisten tai antibioottihoitoa vaativien infektioiden ajaksi. Se voi aiheuttaa myös maksa-arvojen ja kolesterolitason nousua, valkosolujen ja verihiutaleiden määrän laskua ja erittäin harvinaisena haittavaikutuksena maha-suolikanavan puhkeamisen.

### Raskaus ja imetys

Lääkettä ei suositella käytettäväksi raskauden tai imetyksen aikana. Lääke suositellaan tauotettavaksi 12 viikkoa ennen suunniteltua raskautta.

### Hoidon seuranta

Turvakokeet tutkitaan kuukauden kuluttua aloituksesta ja jatkossa 3-6 kuukauden välein.

Turvakokeet ovat seuraavat: TVK ja ALAT.

KREA, U-Kemseu, CRP ja La tutkitaan sairauden hoitoarvion yhteydessä ennen lääkärikäyntiä 6-12 kk välein. Lipidit tutkitaan ennen hoidon aloitusta ja 3 kk kuluttua hoidon aloituksesta.

### Muuta huomioitavaa

Sarilumabi tauotetaan vähintään kaksi viikko ennen ja jälkeen leikkauksen. Leikkaus ajoitetaan ajankohtaan, jolloin seuraava lääkeannos otettaisiin. Yksittäisen potilaan lääketauon pituuteen vaikuttaa myös leikkauksen tyyppi ja kiireellisyys, potilaan yleinen infektioriski ja perussairauden uusiutumiseriski. Lääkitys voidaan aloittaa uudelleen, kun haava on hyvin parantunut.

Elävää, heikennettyä taudinaiheuttajaa sisältäviä rokotteita ei pidä antaa hoidon aikana. Ennen lääkehoidon aloitusta hampaat tulee olla hoidetut ja rokotusten ajan tasalla.

**Linkki** [Reumalääkkeiden ohjeet | Reumatalo.fi | Terveyskylä.fi](#)

## **Yhteystiedot**

Reumasairauksien poliklinikka

Soittoaika klo 09-12

p.02 627 8612