

Sekukinumabi, COSENTYX® – reumasairauksien hoidossa

Käyttöaiheet

Sekukinumabia käytetään aktiivisen nivelpsoriaasin ja selkärankareuman hoidossa kun perinteisillä reumalääkkeillä tai muilla biologisilla reumalääkkeillä ei ole saavutettu riittävää hoitovastetta tai niitä ei voida käyttää.

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Sekukinumabi kuuluu biologisten lääkeaineiden ryhmään. Sytokiinit, solujen väliset viestinviejäaineet, ylläpitävät tulehdusreaktiota nivelreumassa ja muissa tulehduksellisissa nivelsairauksissa. Sekukinumabi on Interleukiini-17A (IL-17A) vasta-aine ja se neutraloi IL-17A -sytokiinin biologista aktiivisuutta. Lääke rauhoittaa niveltulehdusta ja estää sen etenemistä. Lääkevaste ilmaantuu 4 kuukauden kuluessa hoidon aloituksesta.

Annostus ja antotapa

Sekukinumabi annostellaan ihonalaisena pistoksena käyttämällä esitäytettyä 150 mg ruiskua tai kynää. Aluksi lääke annostellaan viikon välein ensimmäiset viisi kertaa, jonka jälkeen ylläpitoannos annetaan kerran kuukaudessa. Joissain tilanteissa nivelpsoriaasin hoidossa voidaan käyttää 300 mg (2 ruiskullista) kerta-annostelua.

Haittavaikutukset

Mahdollisia haittavaikutuksia ovat mm. nuha, ripuli, nokkosrokko ja veren valkosolujen laskua. Sekukinumabi saattaa lisätä alttiutta infektioihin kuten ihon sieni-infektioihin ja hengitystieinfektioihin. Allergiset reaktiot ja vakavat infektiot ovat kuitenkin melko harvinaisia. Lääke tulee tauottaa kuumeisten tai antibioottihoitoa vaativien infektioiden ajaksi.

Raskaus ja imetys

Sekukinumabia ei suositella käytettäväksi raskauden tai imetyksen aikana. Lääke suositellaan tauotettavaksi 20 viikkoa ennen suunniteltua raskautta.

Hoidon seuranta

Turvakokeet tutkitaan **kuukauden kuluttua aloituksesta ja jatkossa harkinnan mukaan 3-6 kuukauden välein**. Turvakokeet ovat seuraavat: **PVK, B-NEUT ja ALAT**.

KREA, U-Kemseu, CRP ja La tutkitaan sairauden hoitoarvion yhteydessä ennen lääkärikäyntiä 6-12 kk välein.

Muuta huomioitavaa

Sekukinumabi tauotetaan vähintään neljä viikkoa ennen ja kaksi viikkoa jälkeen leikkauksen. Leikkaus ajoitetaan ajankohtaan, jolloin seuraava lääkeannos otettaisiin. Yksittäisen potilaan lääketauon pituuteen vaikuttaa myös leikkauksen tyyppi ja kiireellisyys, potilaan yleinen

infektioriski ja perussairauden uusiutumisriski. Lääkitys voidaan aloittaa uudelleen, kun haava on hyvin parantunut.

Elävää, heikennettyä taudinaiheuttajaa sisältäviä rokotteita ei pidä antaa hoidon aikana. Ennen lääkehoidon aloitusta hampaat tulee olla hoidetut ja rokotusten ajan tasalla. Jos sekukinumabia käytetään Crohnin tautia tai haavaista paksusuolitulehdusta sairastaville, on suolioireiden paheneminen mahdollista.

Linkki [Reumalääkkeiden ohjeet | Reumatalo.fi | Terveyskylä.fi](#)

Yhteystiedot

Reumasairauksien poliklinikka
Soittoaika klo 09-12
p.02 627 8612