

Sertolitsumabipegoli, CIMZIA® – reumasairauksien hoidossa

Käyttöaiheet

Sertolitsumabipegolia (Cimzia®) käytetään mm. nivelreuman, selkärankareuman, nivelpsoriaasin ja lastenreuman hoidossa, kun perinteisillä reumalääkkeillä ei ole saavutettu riittävää hoitovastetta tai niitä ei voida käyttää.

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Sertolitsumabipegoli kuuluu biologisten lääkeaineiden ryhmään. Sytokiinit, solujen väliset viestinviejäaineet, ylläpitävät tulehdusreaktiota nivelreumassa ja muissa tulehduksellisissa nivelsairauksissa. Tulehduksen kannalta keskeisimpiä sytokiineja on mm. kasvainnekroositekijä (Tumor Necrosis Factor, TNF). Sertolitsumabipegoli on kasvainnekroositekijän TNF vasta-aine ja se neutraloi TNF:n biologista aktiivisuutta. Lääke rauhoittaa niveltulehdusta ja estää sen etenemistä sekä nivelten vaurioitumista

Annostus ja antotapa

Sertolitsumabipegolia annetaan ihonalaisena pistoksena 200-400 mg kahden viikon välein käyttämällä joko esitäytettyä ruiskua tai kynää. Alussa annos on kolmesti 400 mg (2 kpl 200mg:n pistosta saman päivän aikana) viikoilla 0, 2 ja 4.

Haittavaikutukset

Yleisin haittavaikutus on iholla lääkkeen pistoskohdassa ilmenevä paikallinen ärsytysoire kuten punoitus, kipu tai kutina. Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat mm. hengitysinfektiot, ihottuma, kutina, päänsärky, sydämen vajaatoiminnan paheneminen ja verenkuvan muutokset. Sertolitsumabipegoli saattaa lisätä alttiutta infektioihin. Allergiset reaktiot ja vakavat infektiot ovat kuitenkin melko harvinaisia. Lääke tulee tauottaa kuumeisten tai antibioottihoitoa vaativien infektioiden ajaksi. Tuberkuloosiin sairastumisen riski on selvitettävä jo ennen hoidon aloitusta.

Raskaus ja imetys

Sertolitsumabipegoli lopetetaan, kun raskaus todetaan. Sen käyttöä voidaan kuitenkin harkita myös raskauden aikana. Lääkettä voidaan käyttää imetyksen aikana ensimmäisen imetysviikon jälkeen.

Hoidon seuranta

Turvakokeet tutkitaan kuukauden kuluttua aloituksesta ja jatkossa 3-6 kuukauden välein. Tulokset tarkistetaan terveystieteiden keskuksessa. Turvakokeet ovat seuraavat: PVK, B-NEUT ja ALAT. KREA, U-Kemseu, CRP ja La tutkitaan sairauden hoitoarvion yhteydessä ennen lääkärikäyntiä 6-12 kk välein.

Muuta huomioitavaa

Sertolitsumabipegoli tauotetaan noin kaksi viikkoa ennen ja jälkeen leikkauksen. Leikkaus ajoitetaan ajankohtaan, jolloin seuraava lääkeannos otettaisiin. Yksittäisen potilaan lääketauon pituuteen vaikuttaa myös leikkauksen luonne ja kiireellisyys, potilaan yleinen infektoriski ja perussairauden uusiutumiskirski. Lääkitys voidaan aloittaa uudelleen, kun haava on hyvin parantunut.

Elävää, heikennettyä taudinaiheuttajaa sisältäviä rokotteita ei pidä antaa hoidon aikana. Ennen lääkehoidon aloitusta hampaat tulee olla hoidetut ja rokotukset ajan tasalla.

Linkki [Reumalääkkeiden ohjeet | Reumatalo.fi | Terveyskylä.fi](#)

Yhteystiedot

Reumasairauksien poliklinikka
Soittoaika klo 09-12
p.02 627 8612