

Suun alueen kirurginen toimenpide

Verenvuoto ja turvotus

Toimenpiteen jälkeen saa syödä 2 tunnin kuluttua.

Ruokien tulisi olla pehmeitä ja jäähdytettyjä.

Vältä tupakointia ja voimakasta rasitusta parin päivän ajan.

On normaalia, että haava vuotaa verta jonkin verran ensimmäisten vuorokausien ajan.

Jos vuoto on runsasta, tee sideharsosta sykerö ja pure 30-60 minuuttia. Toista tarvittaessa.

Turvotusta voi vähentää pitämällä jääpussia turvonneen alueen päällä leikkauspäivänä.

Turvotus on normaalia ja voimakkaimmillaan 2-3 vuorokautta toimenpiteen jälkeen. Suun avautuminen voi olla vaikeutunut alussa, mutta helpottaa, kun turvotus laskee.

Kipu ja lääkitys

Jos tuntuu kipua, on hyvä käyttää muutaman päivän ajan tavallisia reseptivapaita särkylääkkeitä tai lääkärin reseptillä määräämiä.

Mahdollinen antibioottikuuri tulee syödä ohjeen mukaan loppuun, vaikka kipu ja muut oireet helpottaisivat aikaisemmin.

Suuhygieniä

Ruokailun jälkeen on hyvä huuhtoa suu puhtaalla vedellä.

Suun puhdistukseen voi käyttää desinfioivaa suuhuuhdetta (Corsodyl®, Paroex®).

Hampaita saa harjata seuraavasta päivästä lähtien, mutta leikkauskohtaa kannattaa varoa muutaman päivän ajan.

Mikäli leikkausalueella on ompeleita, ne sulavat itsestään noin 2-3 viikossa

Mahdolliset ongelmat

Ota yhteyttä, jos ilmenee seuraavia ongelmia:

- verenvuoto on runsasta tai jatkuu yli 1 vrk
- särky lisääntyy vielä 3 vrk:n jälkeen
- ilmenee nopeasti lisääntyvää turvotusta
- on hengitys- tai nielemisvaikeuksia
- lämpö nousee yli 38°

Yhteystiedot

Ota tarvittaessa yhteyttä sinua hoitaneeseen yksikköön

Puhelin: _____

tai päivystysaikaan puhelin 116 117

Hammas-, suu- ja leukasairauksien poliklinikka, Satasairaala

Maanantaista perjantaihin kello 8.00-10.00 ja 12.30-14.00

Puhelin 02 627 7227