

Kohdunpoistoleikkaus emättimen kautta

Tämä ohje on tarkoitettu tulostettavaksi. Ohje sisältää täytettäviä kohtia.

Kohdunpoistoleikkauksella hoidetaan erilaisia kohdun ja sen sivuelinten sairauksia. Tavallisin kohdunpoiston aihe on myooma eli hyvän laatuinen lihaskasvain kohdun seinämässä. Muita kohdunpoistolla hoidettavia sairauksia ovat muun muassa kipuja ja runsaita vuotoja aiheuttavat sairaudet, kohdun pahanlaatuisten muutosten esiasteet sekä kohdun ja munasarjojen syöpäkasvaimet. Jos molemmat munasarjat poistetaan niissä olevan sairauden vuoksi, samalla yleensä poistetaan myös kohtu.

Toimenpide

Toimenpide tehdään yleensä selkäydinpuudutuksessa tai yleisanestesiassa. Kohtu poistetaan tavallisesti kokonaisuudessaan. Emättimen kautta tai tähytysavusteisesti suunniteltu kohdun poisto joudutaan joskus leikkauksen aikana muuttamaan avoleikkaukseksi.

Toipuminen

Kohdunpoiston jälkeen kuukautisia ei enää tule. Raskaus ei enää ole mahdollinen, joten ehkäisyä ei tarvita. Toipumisvaiheen jälkeen sukupuolielämälle ei ole rajoitteita, eikä leikkaus vähennä sen miellyttävyyttä.

Leikkauksen jälkeen osastolla toipumiseen menee muutama tunti. Kotiin pääsee, kun virtsaus onnistuu. Sairausloman aikana tulee välttää ponnistelua, nostelua, kumartelua, mattojen ravistelua, kurkottelua ja pyöräilyä sekä pitkään istumista. On myös vältettävä ponnistelua ulostaessa, tilapäisesti voi käyttää ilman reseptiä saatavia ulostuslääkkeitä. Ummetuksen esto on muutenkin jatkossa tärkeää.

Haavanhoito

Haavassa on itsestään sulavat ompeleet, joita ei tarvitse poistaa. Alapesut tulee suorittaa vähintään aamuin illoin leikkauksen jälkeisestä päivästä lähtien. Saunaan voi mennä viikon kuluttua toimenpiteestä. Vähentääksesi tulehdusriskiä tulisi kahden viikon ajan välttää yhdyntää, uintia, ammekylpyä ja tamponien käyttöä. Verensekaista vuotoa voi esiintyä muutaman viikon ajan. Sen jälkeen haavat vähitellen parantuvat.

Kivunhoito

Kipulääkkeitä on hyvä ottaa säännöllisesti 1–4 vuorokauden ajan ja sen jälkeen tarvittaessa:

Parasetamoli

Tulehduskipulääke

Vahva kipulääke

Muut lääkkeet

Sairausloma on 3–4 viikkoa. Jos jälkitarkastus katsotaan aiheelliseksi, siitä sovitaan erikseen kotiutettaessa.

Yhteydenotot

Jos esiintyy tulehdusoireita (kuumetta, kovia kipuja, runsasta tai pahanhajuista vuotoa) tai muuta erityistä, tulee ottaa yhteyttä:

Päiväkirurginen yksikkö, arkisin kello 07.00–15.00, puhelin 06 213 1552,

Naistentautien poliklinikka, arkisin kello 14.00–15.00, puhelin 06 213 2012,

Oma terveystakeskus tai työterveyshuolto

Sairaanhoidon puhelinneuvonta maanantaista torstaihin kello 15.00–08.00, perjantaisin kello 14.00–08.00 sekä vuorokauden ympäri viikonloppuisin ja arkipyhäisin, puhelin 116 117

Vaasan sairaanhoitopiiri • www.vaasankeskussairaala.fi • Vaihde 06 213 1111

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.